

必告知醫師或藥師

1

在看診或使用藥物前，你必須記得告訴醫師或藥師下列事項：

1

是否曾對藥品發生過敏現象？

告訴醫師你是否對藥品曾經發生過敏或是異常反應，醫師就不會再開立類似藥品給你，避免你再發生同樣的藥品不良反應。

2

過去數週是否服用過其他藥品？

有些藥品在體內的作用會持續很久，可能會影響你現在要服用的藥品，造成副作用增加或藥效減弱。



國立成功大學醫學院
附設醫院藥劑部 編製

本衛教單張並未包含所有資訊，
若有其他相關問題，請詢問藥師
連絡電話: (06)-2353535轉2515

3

是否有其他疾病？

- ✓ 某些疾病會影響藥品在體內的作
用。例如：肝、腎功能不良時，
可能延長藥品自體內排出的時間
或加強藥品的毒性。

告知醫師是否有其他疾
病，讓醫師幫您評估藥
品使用之適當性，以及
是否需要調整劑量，或
定期監測是否有副作用
發生以及早處理。



4

是否準備懷孕或已經懷孕？

有些藥品可能會透過胎盤而影響胎兒健康，懷孕婦女使用時需特別小心。有些藥品則不建議懷孕婦女使用。

5

是否親自餵母乳？

有些藥品會分泌至乳汁，若母親哺餵母乳，可能使嬰兒受到藥品的影響

若準備懷孕、已經懷孕或有餵母乳時，務必告訴醫師。醫師會依您懷孕階段或授乳，及藥品與疾病情形，選擇最適當的藥物哦！



6

近期是否已安排手術？

若有服用抗凝血劑時，
可能增加手術時發生
出血的風險。

增加出
血風險



有服用抗凝血劑時請注意！

若有安排手術或醫療計劃，
請告知抗凝血劑之開方醫師
及為您手術的醫師，讓醫師
評估手術或處置前是否需暫
時停藥，以及手術後何時開
始繼續服藥。

