



# 定量噴霧劑(MDI)

1

1

## 什麼是定量噴霧劑(MDI)？

定量噴霧劑內含藥品和推進劑，按壓藥瓶時，藥品會霧化成小顆粒，並噴出定量的藥品供病人吸入

優點	安全、無全身性副作用	
缺點	支氣管擴張劑	心悸、手抖
	類固醇	聲音沙啞、口腔念珠菌感染



### Foster 肺舒坦

支氣管擴張劑+類固醇



### Seretide 使肺泰

支氣管擴張劑+類固醇



### Berotec N 備勞喘

支氣管擴張劑

國立成功大學醫學院  
附設醫院藥劑部 編製

本衛教單張並未包含所有資訊，  
若有其他相關問題，請詢問藥師  
連絡電話: (06)-2353535轉2515





# 定量噴霧劑(MDI)

2

## 2 如何使用定量噴霧劑



拿開蓋子



上下搖動  
避免藥物沉澱



接上塑膠延伸管



# 定量噴霧劑(MDI)

3

## 2 如何使用定量噴霧劑



吐一口氣  
(不可對吸入劑吐氣)



含住延伸管  
按下藥瓶**同時**深深吸氣



閉氣**5-10秒**  
然後恢復正常呼吸

若要吸入第二劑  
**間隔30秒**後再使用



# 定量噴霧劑(MDI)

4

## 2 如何使用定量噴霧劑

### 吸藥輔助器



若您使用的是吸藥輔助器  
藥物噴出後，**正常呼吸6-10次**(不需閉氣)

## 3 使用定量噴霧劑後

- ◆ 若您使用的是使肺泰  
→ 使用後需**漱口**預防口腔念珠菌感染
- ◆ 吸入器存放在陰涼乾燥處，勿陽光直射

塑膠延伸管的清潔：

- 平時將管口擦拭乾淨後即可收起
- 若要清洗，用**清水**即可，清洗完後**陰乾**勿曬太陽