




藥品磨粉弊多於利

1

1

藥品磨粉有什麼壞處呢？

- ✓ 磨粉後暴露在空氣中，比較不安定，容易潮解變質。
- ✓ 藥品磨粉後，可能受其他藥品汙染。
- ✓ 磨粉後分包，藥量可能不均勻。
- ✓ 磨粉後藥品成分無法辨識，發生過敏或副作用時無法判斷是哪種藥造成的



- ✓ 有些藥品的成分或設計，不宜磨碎或嚼碎，例如：緩釋錠、腸溶錠、舌下錠。
- ✓ 磨粉可能對口腔黏膜或腸胃道產生刺激。
- ✓ 藥品磨粉後味道可能變差。



國立成功大學醫學院
附設醫院藥劑部 編製

本衛教單張並未包含所有資訊，
若有其他相關問題，請詢問藥師
連絡電話: (06)-2353535轉2515



藥品磨粉弊多於利

2

2

不宜磨粉又不能吞藥丸怎麼辦？

- ✓ 若為孩童，可建議醫生以成分相同藥水或懸液劑來取代。
- ✓ 若只需服用半顆或四分之一顆，可用切藥器將藥品切割。
- ✓ 易溶化的藥品，服用前先泡在冷開水中，使其溶解再服用。
- ✓ 給藥前才磨粉，確保藥品安定性，也可避免污染的問題。
- ✓ 自備研鉢，一次只磨一種藥，而且只磨當次所需的藥量。
- ✓ 研磨器使用過後務必清洗乾淨，避免藥品殘留於器具上