

# 藥品儲存須知

1

1

## 藥品儲存須注意什麼呢？

若未特別標示，藥品應放在陰涼乾燥處，**避光、避濕、避熱**

需放在冰箱冷藏的藥品，要和食物分開放

藥品應放在原有包裝內。內服、外用藥品分開保存，以免混淆。

開封後，**棉花和乾燥劑**應立即**丟棄**。  
藥品變色或有異味，也應立即丟棄。

放在小孩不易拿到的地方，如：上鎖的抽屜。

定期檢查家中藥品，過期藥品不宜再保存。



國立成功大學醫學院  
附設醫院藥劑部 編製

本衛教單張並未包含所有資訊，  
若有其他相關問題，請詢問藥師  
連絡電話: (06)-2353535轉2515

## 2 液劑/懸浮劑儲存須知

一般液劑/懸浮劑像胃乳、感冒或咳嗽藥水，**室溫保存**即可，**不宜冷藏**，否則沉澱不易搖勻。

## 3 抗生素糖漿劑/懸浮劑儲存須知

- 尚未開封前（乾粉），可在避免直射日光的室溫環境下存放
- 加水沖泡後需存放在**冰箱**中，**使用前充分搖勻**。

## 4 肛門、陰道栓劑儲存須知


- 多數需放**冰箱下層**以免軟化。
- 有軟化現象時，可放置冰冷水中，或放入冰箱冷藏數分鐘使變硬後再除去外包裝。

## 5 眼藥水儲存須知

- 一般放在**室溫**下即可。有特別標示需放在冰箱冷藏者，則依標示處理。
- 開封後**一個月內**未用完，應即**丟棄**！

## 6 胰島素製劑儲存須知

- 未開封時應存放在冰箱下層冷藏。
- 開封後可存放在室溫，並在**一個月內**使用完。



## 7 未使用完藥物

- 沒有吃完的藥，若家人有相同症狀時，不可拿出來給他們吃，因為不是每個人都適合相同藥物。