

成醫藥誌

Pharmacy Forum

發行人：林 炳 文
 總編輯：張 慧 真
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號 藥 理 藥品名稱
 分類號

804846 4540 Neomycin & Trypsin (Antibiotic)

'Shielin' powder 10g/btl

Each g contains:

Neomycin Sulfate.....10 mg

Trypsin Crystallized.....2,500 U

Usual dose: 1 gm locally.

衛生署適應症：膺炎、傳染性膿皮症、膿瘍、癰、疔、瘰癧、腋臭、外傷、火傷、皮膚移植後感染。

ADR：Local irritation.

備註：原臨購品項，第 107 次藥委會同意列入本院處方用藥。

783058 7290 Ranibizumab (OPH Miscellaneous Agent) 冷藏

'Lucentis' 2.3mg/0.23mL/vial

Usual dose: IVI, 0.5 mg (0.05 mL) injected intravitreally into the eye once monthly.

注意事項：

1. 單次使用，限玻璃體內注射(Intravitreal use)。
2. 注射程序應在無菌環境下進行。
3. 與雷射光凝療法至少相隔 30 分鐘。
4. 可能導致暫時性視覺障礙，影響操作機具能力。

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：(1)治療血管新生型(濕性)年齡相關性黃斑部退化病變(age-related macular degeneration, AMD)。(2)治療糖尿病引起黃斑部水腫(diabetic macular edema, DME)所導致的視力損害。(3)治療視網膜靜脈阻塞(分支或中央視網膜靜脈; branch or central retinal vein occlusion; BRVO 或 CRVO)續發黃斑部水腫所導致的視力損害。

ADR: Nasopharyngitis, headache, arthralgia, intraocular inflammation, vitreitis, vitreous detachment, eye irritation, foreign body sensation in the eyes, eye pruritis, raised intraocular pressure.

禁忌：對此成份過敏、有或疑似眼睛或眼睛周圍感染者、眼內發炎者。

備註：原臨購品項，第 107 次藥委會同意列入本院處方用藥。

660753 6630 Amino acid 5.5% + Glucose 20% + 10% Lipid emulsion (Parenteral Nutrition Therapy) 腎 肝

'Oliclinomel' 1500ml/bag

Each 1500 ml solution contains:

Lipid emulsion.....300ml

Amino acid solution....600ml

Glucose solution.....600ml

Ingredient contents (mg/dL)		Ingredient contents (mg/dL)	
Essential amino acids		Nonessential amino acids	
Isoleucine	1.98	Arginine	3.795
Leucine	2.415	Alanine	6.84
Lysine	1.92	Glycine	3.405
Methionine	1.32	Proline	2.25
Phenylalanine	1.845	Serine	2.75
Threonine	1.38	Tyrosine	0.135
Tryptophan	0.6		
Valine	1.92	Electrolytes (mmol)	
Histidine	1.59	Na ⁺	32
		K ⁺	24
		Ca ²⁺	3
		Mg ²⁺	3.3
		Cl ⁻	50
		HPO ₄ ²⁻	13
		Acetate ⁻	46
Total Amino Acids (g)		33	
Total Nitrogen (g)		5.4	
Caloric Value (Kcal/L)		910	
Osmolarity (mOsm/L)		750	

Usual Dose: IVD.

Adult: Average nitrogen requirements are 0.16-0.35 g/kg/day, max. daily dose is 40 ml/kg.

Child > 2 yr: Average nitrogen requirements are 0.35-0.45 g/kg/day, max. daily dose is 100 ml/kg.

注意事項：請從密封袋頂端(吊孔端)開始將袋子捲起來，待封條完全打開後，須將藥袋上下顛倒至少三次讓內容物完全混合。

衛生署核准適應症：適於成人及二歲以上孩童在無法或因有禁忌症而不適宜進食或使用口服腸道營養劑時之靜脈營養。

ADR：Nausea, hyperlipidemia, fatty infiltration, fever, headache, dyspnea.

禁忌：早產兒、< 2 歲兒童、對蛋類或黃豆類蛋白質過敏者、嚴重腎功能不全而無法進行透析者、嚴重肝功能不全、先天性胺基酸代謝異常、嚴重血液凝固不全、嚴重高血脂症、高血糖症或對靜脈輸液有禁忌者。

備註：第 107 次藥委會同意列入本院處方用藥。

282850 4850 Meglumine Gadoterate (Gd-DOTA) (Magnetic Resonance Radiopaque) 腎

'Dotarem' 20ml/vial

Each 100ml contain:

DOTA.....20.246g

Gadolinium oxide.....9.062g

Usual Dose: IV, 0.2 ml/kg.

For certain neuroradiology examinations, a second injection of 0.4 ml/kg can be administered. A second injection of 0.2 ml/kg may be justified for angiography of certain regions.

注意事項：嚴重腎功能不全者，應特別注意可能引起腎生性之全身性纖維病變(Nephrogenic systemic fibrosis)。

衛生署適應症：核磁共振影像：(1)神經放射學(neuroradiology)：脊椎及周圍組織的腫瘤、顱內腫瘤。(2)腹部放射學(abdominal radiology)：原發性及續發性腫瘤。(3)骨及軟組織之原發性腫瘤。(4)用於全身其他部位及血管攝影。

ADR：Headache, paresthesia, warm/coldness or pain at the injection site, nausea, vomiting, skin rash, pruritis, anaphylactic-like reactions.

禁忌：對此成份過敏、帶心律調整器或血管夾者。

備註：第 107 次藥委會同意列入本院處方用藥。