

成醫藥誌



Pharmacy Forum

發行人：楊 俊 佑
總編輯：張 慧 真
主 編：藥品諮詢組
地 址：台南市勝利路 138 號
電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
八十年十月創刊
新聞局出版事業登記證
局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號 藥 理 藥品名稱
分類號

020850 6340 Abatacept (Immunomodulator) 冷藏

'Orencia' 250mg/vial

Usual Dose: IVD > 30 mins.

Following the initial IV infusion, repeat dose (using the same weight-based dosing) at 2 and 4 wks after the initial infusion, and every 4 wks thereafter.

RA: < 60 kg, 500 mg/dose ; 60-100 kg, 750 mg/dose ; > 100 kg, 1000 mg/dose.

JIA (≥ 6 yr): < 75 kg, 10 mg/kg ; 75-100 kg, 750 mg/dose ; > 100 kg, 1000 mg/dose . Max. 1000 mg/dose.

注意事項：

1. 不建議與其他治療類風濕性關節炎的生物製劑併用。
2. 不應使用於結核病人。
3. 活疫苗不可與 Orencia 同時投與，也不可以在停用 Orencia 的 3 個月內使用。

孕婦安全分級：C

許可證適應症：

1. 類風濕性關節炎(RA) - Orencia 與 methotrexate 併用，用於治療罹患有中度至重度活動性類風濕性關節炎且對其他疾病修飾抗風濕病藥物[包括 methotrexate (MTX)或一種腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑]反應不良或耐受性不佳的成人患者。
2. 幼年型慢性關節炎(JIA) - Orencia 與 methotrexate 併用，用於治療罹患有中度至重度幼年型慢性關節炎且對其他疾病修飾抗風濕病藥物[包括一種腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑]反應不良或耐受性不佳的 6 歲或 6 歲以上兒童患者。

ADR：Headache, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, nausea, infection, hypertension, dizziness, dyspepsia, cough.

禁忌：嚴重或是無法控制的感染。