

成醫藥誌

Pharmacy Forum

發行人：林 炳 文
 總編輯：張 慧 真
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號	藥 理 分類號	藥品名稱
526447	7230	Levofloxacin Ophthalmic Solution (Ocular Antimicrobial Preparation) 避光 'Cravit' oph solution 0.5%, 5ml/btl Usual Dose: 1 gtt tid. 孕婦安全分級：C 衛生署適應症：外眼部細菌性感染症。 ADR：Eye irritation, eye itching, blepharitis. 禁忌：對此成份過敏者。 備註：第 103 次藥委會同意列入本院處方用藥，與 Ciprofloxacin (Ciloxan) Oph Sol 0.3%, 5ml/btl 競標。
386746	7815	Beclomethasone/Formoterol (Compound Preparation used in Asthma) 冷藏 'Foster' 100mcg/6mcg/dose, 120 dose/btl Usual Dose: Adult $\geq$ 18yr: 1-2 puff bid. Max. 4 puff/day. 孕婦安全分級：C 衛生署適應症：適用於需規律使用吸入型皮質類固醇與長效 beta-2 致效劑合併治療的氣喘病患。 ADR：Pharyngitis, headache, dysphonia. 禁忌：對 beclomethasone、formoterol 及/或任何本品所含賦形劑成份過敏者。 備註：第 105 次藥委會同意列入本院處方用藥，並刪除 Formoterol Turbuhaler (Oxis) 9 mcg/dose, 60 dose/btl。
788225	6953	Ropinirole (Dopamine Receptor Agonist) 不宜磨 'Requip PD' 4mg/PR tab Usual Dose: Initial, 2 mg once daily for 1-2 weeks, followed by increases of 2 mg/day at a weekly or longer interval based on therapeutic response and tolerability. Max. 24 mg/day.

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：治療帕金森氏症。

ADR：Somnolence, dizziness, hallucinations, nausea, abdominal pain, peripheral edema.

禁忌：對 ropinirole 或賦形劑過敏者。

備註：第 105 次藥委會同意列入本院處方用藥。

786623 7553

Risperidone (Atypical antipsychotic) 避光 腎 肝

'Risperdal' 3mg/FC tab

Usual Dose:

Adult: Initial, 2 mg/day, once or twice daily; increase in increments of 1-2 mg/day to 4-8 mg/day. Max. 16 mg/day.

Elderly, renal and liver disease: Initial, 0.5 mg bid, then increases in increments of 0.5 mg bid to 1-2 mg bid.

Child: Initial, 0.5 mg once daily, adjust dosage in increments of 0.5-1 mg/day to 2.5-3 mg/day.

注意事項：1.老年失智症患者合併精神病症狀，服用非典型精神病藥物有較高之死亡率。

2.小心使用於已知有心臟血管疾病或相關危險患者。

3.建議糖尿病病人及具糖尿病危險因子的病人要進行適當的臨床監護。

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作。治療失智症病人具嚴重攻擊性，或精神分裂症類似症狀。

ADR：Dry mouth, constipation, weight gain, insomnia, anxiety, restlessness, dizziness, headache.

備註：第 105 次藥委會同意列入本院處方用藥，並取代 2mg/tab。

782120 7553

Quetiapine Fumarate (Atypical antipsychotic) 肝 不宜磨

'Seroquel XR' 50mg/ER tab

Usual Dose: Initial, 300 mg/day, preferably in the evening, the dose should be titrated within a dose range of 400-800 mg/day depending on response and tolerance.

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：治療精神分裂症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作或混合發作。對於抗鬱劑單一藥物治療效果不佳的重鬱症(MDD)病人，可作為重鬱症發作的附加治療。

ADR：Somnolence, dry mouth, dizziness, weight gain, constipation, dyspepsia.

備註：第 105 次藥委會同意列入本院處方用藥。