

成醫藥誌

Pharmacy Forum

發行人：林 炳 文
 總編輯：周 辰 熹
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號	藥 理 分類號	藥品名稱
887841	7813	Tiotropium 腎 'Spiriva' Respimat 2.5mcg/dose, 60dose/btl Usual dose: 5 mcg qd. 孕婦安全分級：C 適應症：慢性阻塞性肺疾(包括慢性支氣管炎及肺氣腫)之維持治療。 ADR：Dry mouth, cough, throat irritation. 禁忌：對 atropine 及其衍生物或此成份過敏者。 備註：第101次藥委會同意列入本院處方用藥，並刪除Spiriva HandiHaler®。
129725	7536	Bupropion 肝 不宜磨 'Wellbutrin XL' 150mg/F.C. tab Usual dose: Initially, 150 mg once daily in the morning, may increase to a target dose of 300 mg once daily. 孕婦安全分級：C 適應症：治療憂鬱症。 ADR：Insomnia, dizziness, dry mouth, headache, rash, pruritus, anxiety, weight loss. 禁忌：對此成份過敏、癲癇、患有厭食症者、併用 MAOI。 備註：第 101 次藥委會同意列入本院處方用藥，取代 Wellbutrin SR。
782223	7553	Quetiapine 肝 不宜磨 'Seroquel XR' 200mg/ER tab Usual dose: Initially 300 mg/day, preferably in the evening, the dose should be titrated within a dose range of 400-800 mg/day depending on response and tolerance. 孕婦安全分級：C 適應症：治療精神分裂症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作及混合性發作。 ADR：Somnolence, dry mouth, dizziness, weight gain, constipation, dyspepsia.

- 備註：第 101 次藥委會同意列入本院處方用藥，取代 Seroquel 100mg/tab。
- 967529 7513 Zolpidem 肝 不宜磨
 'Stilnox CR' 6.25mg/tab
 Usual dose: 6.25 mg hs.
 孕婦安全分級：C
 適應症：失眠症。
 ADR：Headache, somnolence, dizziness, diplopia, hallucination.
 備註：第 101 次藥委會同意列入本院處方用藥，與 10mg/tab 併用一年後再議。
 除精神科外，其他科別每日限開 1 錠。
- 526130 6910 Levetiracetam 肝 腎
 'Keppra' oral soln 100mg/ml, 300ml/btl
 Usual dose:
 Monotherapy:
 Adult and adolescents (>16 yr): Initially, 250 mg bid, may be increased up to 1500 mg bid. Dose changes can be made in 250 mg bid increments q2wk.
 Add-on therapy:
 Adult (≥ 18 yr) and adolescents (12-17 yr) ≥ 50 kg: Initially, 500 mg bid, may be increased up to 1500 mg bid. Dose changes can be made in 500 mg bid increments or decrements q2-4wk.
 Child (4-11 yr) and adolescents (12-17 yr) < 50 kg: Initially, 10 mg/kg twice daily.
 孕婦安全分級：C
 適應症：十六歲以上病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。四歲以上孩童及成人病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作，以及十六歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。
 ADR：Asthenia, somnolence, dizziness, headache, anorexia, vomiting.
- 308558 2430 Epoprostenol
 'Flolan' 0.5mg/vial
 Usual dose:
 Short-term (acute) dose ranging: Initially, 2 ng/kg/min and increased by increments of 2 ng/kg/min every 15 min or longer until max. haemodynamic benefit or dose-limiting pharmacological effects are elicited.
 Long-term continuous infusion: Initially, 4 ng/kg/min less than the max. tolerated infusion rate determined during short-term dose-ranging. If the

max. tolerated infusion rate is < 5 ng/kg/min, the long-term infusion should be started at one-half the max. tolerated infusion rate.

孕婦安全分級：B

適應症：原發性肺動脈高血壓。

ADR：Headache, flushing, nausea, vomiting, diarrhea, jaw pain.

禁忌：對此成份過敏、重度左心室功能不全所導致的鬱血性心臟衰竭、長期用於劑量探測期間出現肺水腫者。

526259 1580

Levofloxacin 腎 避光

'Cravit' 250mg/50ml/btl

Usual Dose:

UTI: 250 mg qd.

Other infection: 500-750 mg qd.

注意事項：針劑須以原包裝避光儲存(移除外包裝後，室內照明保存期限為 3 天)，開封後需於 3 小時內使用完畢。

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：治療成人因對 Levofloxacin 有感受性的致病菌所引起之下列感染：社區性肺炎、複雜性尿道感染(包括：腎盂腎炎)、皮膚和軟組織感染、慢性細菌性前列腺炎。

ADR：Nausea, diarrhea, constipation, insomnia, rash, dizziness, headache, abdominal pain.

禁忌：對此成份或 Quinolone 類過敏、癲癇、兒童及青少年、懷孕、哺乳。

備註：藥委會同意抗生素管理小組之建議進用 250mg/50ml/btl 取代 500mg/100ml/btl。

166255 1523

Ceftazidime sodium 腎 避光

'Fortum' 1g/vial (Na 2.26 mEq/vial)

Usual Dose: IV or IM.

Adult: 1-2 g q8-12h; serious infection, 6 g/day. Max. 6 g/day.

Child & Infant: 30-50 mg/kg q8h. Max. 6 g/day (meningitis 150 mg/kg/day).

Neonate: 30-50 mg/kg q8-12h.

孕婦安全分級：B

衛生署適應症：為殺菌性頭孢子菌抗生素，對多種β-lactam 有抗藥性、並對廣範圍的革蘭氏陽性及陰性的細菌有效。

ADR：Phlebitis, eosinophilia, thrombocytosis, abnormal liver function, rash, diarrhea, injection site pain.

禁忌：對 Cephalosporin 過敏者。

備註：藥委會同意抗生素管理小組之建議進用 1g/vial 取代 Tatumcef[®] 500mg/vial。