



發行人：楊 俊 佑
總編輯：張 慧 真
主 編：藥品諮詢組
地 址：台南市勝利路 138 號
電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
八十年十月創刊
新聞局出版事業登記證
局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號 藥 理 藥品名稱
分類號

243453 6090 Denosumab (Hormones Miscellaneous Agent) 冷藏

'Prolia' 60mg/ml, 1ml/syringe

Usual Dose: SC, 60 mg every 6 months.

注意事項：

1. 皮下注射。
2. 需貯存於 2-8°C，切勿冷凍。
3. 切勿在進行注射之前將綠色安全保護裝置向前滑動超過針頭，以免造成鎖住情形並阻礙注射。

孕婦安全分級：X

衛生署適應症：治療有骨折高風險性之停經後婦女骨質疏鬆症。

ADR：Hypercholesterolemia, back pain, cystitis, upper respiratory infection, headache, diarrhea, fatigue.

禁忌：低血鈣、對此成份過敏者。

備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。

361925 0050 Febuxostat (Antigout Agent and Uricosuric Agent) 腎 肝

'Feburic' 80mg/tab

Usual Dose: 40-80 mg qd.

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：治療慢性痛風患者的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者。

ADR：Abnormal liver function, nausea, arthralgia, rash.

禁忌：正在使用 azathioprine 或 mercaptopurine、對此成份過敏者。

備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。

- 387854 6040 Follitropin alfa & Lutropin alfa (Agent Used to Treat Infertility)
'Pergoveris' 150/75IU/vial
Usual Dose: SC, one vial daily for 7-14 days depending on response. Duration may be extended in any one cycle to up to 5 wks.
注意事項：每一劑量含 30 mg 的蔗糖。糖尿病患者在使用前須考量。
孕婦安全分級：X
衛生署適應症：使用於黃體刺激激素(LH)與濾泡刺激激素(FSH)嚴重缺乏的婦女，以刺激濾泡發育。此類患者臨床試驗中定義為內生性黃體刺激激素血中濃度少於 1.2 IU/L。
ADR：Ovarian cysts, injection site pain, headache, somnolence, abdominal pain, nausea, vomiting.
禁忌：對此成份過敏、卵巢/子宮/乳房腫瘤、下視丘/腦下垂體腫瘤、非多囊性卵巢疾病引起的卵巢增大或囊腫、不明原因的婦科出血。
備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。
- 485320 2450 Irbesartan (Angiotensin II Receptor Antagonist)
'Aprovel' 300mg/tab
Usual Dose: 75-300 mg/day.
孕婦安全分級：C (1st trimester)/D (2nd & 3rd trimester)
衛生署適應症：本態性高血壓、治療併有高血壓及第二型糖尿病患者的高血壓及糖尿病性腎病變。
ADR：Hyperkalemia, orthostatic hypotension, fatigue, dizziness, upper respiratory infection, angioedema.
禁忌：對此成份過敏、懷孕第二及三期、哺乳。
備註：第 109 次藥委會同意列入本院處方用藥，並取代 Aprovel 150mg/tab。
- 543553 6068 Liraglutide (Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonist) 冷藏
'Victoza' 6mg/ml, 3ml/pen
Usual Dose: SC.
Initial, 0.6 mg once daily for 1 wk, then 1.2 mg once daily; may increase to 1.8 mg/day if needed. Max. 1.8 mg/day.
注意事項：
1. 不建議將 Victoza 當作第一線治療藥物。
2. 有胰臟炎病史的患者，應小心使用。
3. Victoza 並非 insulin 的替代品。不可用於第一型糖尿病患者，或用於糖尿病酮酸血症。尚未有 insulin 與 Victoza 併用的研究。
孕婦安全分級：C
衛生署適應症：第 2 型糖尿病。當患者已接受 metformin 或 sulphonylurea 單

一治療至最大可忍受劑量仍未達理想血糖控制時，與 metformin 或 sulphonylurea 併用；或當患者已接受 metformin 加上 sulphonylurea 或 metformin 加上 thiazolidinedione 兩種藥物治療仍未達理想血糖控制時，與 metformin 加上 sulphonylurea 或 metformin 加上 thiazolidinedione 併用。。

ADR：Nausea, diarrhea, vomiting, constipation, headache, upper respiratory tract infection, hypoglycemia.

禁忌：個人或是家族有甲狀腺髓樣癌(MTC)病史、第二型多發性內分泌腫瘤綜合症(MEN2)、對此成份過敏者。

備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。

569030 3340 Megestrol acetate

'Megest' 40mg/ml, 120ml/btl

Usual Dose: Initial, 160-200 mg/day. Max. 400 mg/day.

注意事項：使用前請振搖均勻。

孕婦安全分級：X

衛生署適應症：後天免疫缺乏症候群患者的厭食症，及後天免疫缺乏症候群患者及癌症患者之惡病體質引起的體重明顯減輕。

ADR：Hypertension, headache, insomnia, rash, hyperglycemia, diarrhea, nausea, vomiting, anemia.

禁忌：懷孕、對此成份過敏者。

備註：原臨購品項，第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。

683922 3390 Pazopanib (Anti-Neoplastic Miscellaneous Agent) 飯前 肝 不宜磨

'Votrient' 200mg/tab

Usual Dose: 800 mg once daily. Max. 800 mg/day.

孕婦安全分級：D

注意事項：

1. 與強效 CYP3A4 抑制劑(如：Ketoconazole)併用時，應考慮減低 Pazopanib 的劑量、與強效 CYP3A4 誘導劑(如：Rifampin)併用時，可能會減少 Pazopanib 的濃度，建議避免併用。

2. 服藥期間勿食用葡萄柚(汁)。

衛生署適應症：晚期腎細胞癌之第一線治療，或用於已接受過細胞激素(cytokine)治療失敗之晚期腎細胞癌患者。

ADR：Diarrhea, loss of appetite, nausea, vomiting, headache, hair color change, hypertension, hyperglycemia, leukocytopenia, thrombocytopenia, abnormal liver function.

禁忌：對此成份過敏者。

備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。

788421	5730	Rivaroxaban (Anticoagulant) 腎 肝 'Xarelto' 15mg/tab Usual Dose: Nonvalvular atrial fibrillation: 15-20 mg once daily with the evening meal. Max. 20 mg/day. Deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism (PE): Initial, 15 mg twice daily for 3 wks followed by 20 mg once daily. Max. 30 mg/day. 孕婦安全分級：C 注意事項： 1. 須小心監測出血徵狀。 2. 中度腎功能受損者，須謹慎併用其他會導致 rivaroxaban 血漿濃度上升的藥物。 3. 不建議同時使用在接受 azole-antimycotics 或 HIV 蛋白酶抑制劑全身性治療的病患。 4. 本品含有乳糖，因此患有罕見遺傳疾病，包括半乳糖不耐症、乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良者不應服用。 衛生署適應症：1. 用於非瓣膜性心房顫動(non-valvular atrial fibrillation) 且有下列至少一項危險因子者成人病患，預防中風及全身性栓塞(systemic embolism)。危險因子例如：心衰竭，高血壓，年齡大於等於 75 歲，糖尿病，曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作(transient ischemic attack)。2. 治療急性有症狀近端深部靜脈血栓及預防急深部靜脈血栓發生後再發性深部靜脈血栓與肺栓塞。 ADR：Bleeding, anemia, abnormal liver function, nausea, itching. 禁忌：對此成份過敏、懷孕、哺乳、嚴重肝腎功能受損或嚴重進行性出血者。 備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。
802620	6067	Saxagliptin (Dipeptidyl peptidase IV inhibitor) 腎 不宜磨 'Onglyza' 5mg/tab Usual Dose: 2.5-5 mg once daily. 孕婦安全分級：B 衛生署適應症：第二型糖尿病。 ADR：Headache, urinary tract infection, upper respiratory tract infection, hypoglycemia, peripheral edema. 禁忌：對於 Onglyza 曾發生嚴重過敏反應、對此成份過敏者。 備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。
863326	3350	Tegafur/Gimeracil/Oteracil (Antimetabolite) 腎 肝 'TS-1' 20/5.8/19.6mg/cap

Usual Dose:

According to BSA, administered twice daily after meals for 28 consecutive days, followed by a 14-day rest.

Initial dose: BSA < 1.25 M2: 40 mg each time; BSA 1.25-1.5 M2:

50 mg each time; BSA $\geq$ 1.5 M2: 60 mg each time, may be increased to 75 mg bid.

注意事項：

1. 嚴重腎功能不全患者使用會增加 5-FU 濃度，進而增加骨髓抑制之副作用。
2. 欲服用其它 fluoropyrimidine 類抗癌藥物或抗黴菌藥 flucytosine 者須相隔至少 7 日。

衛生署適應症：胃癌術後輔助性化療，用於罹患 TNM STAGE II (排除 T1)，IIIA 或 IIIB 胃癌且接受過胃癌根治性手術的成年患者。治療無法切除的晚期胃癌。

ADR：Nausea, vomiting, loss of appetite, abdominal pain, gastritis.

禁忌：懷孕、授乳、對此成份過敏者。

備註：原臨購品項，第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。

888650 6340 Tocilizumab (Immunomodulator) 冷藏 避光

'Actemra' 20mg/ml, 10ml/vial

Usual Dose:

RA: Initial: 4 mg/kg every 4 wks; may be increased to 8 mg/kg based on clinical response. Max. 800 mg.

SJIA: < 30 kg, 12 mg/kg every 2 wks; $\geq$ 30 kg, 8 mg/kg every 2 wks.

注意事項：

1. 活動性感染期間，包括局部感染，均不建議給予本品項。
2. 在藥品投予期間及治療之後，應密切觀察是否出現感染相關的症狀。

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：1. 類風濕性關節炎(RA) -Actemra 合併 Methotrexate(MTX) 可用於治療成年人中度至重度類風濕性關節炎，曾使用一種或一種以上之 DMARD 藥物治療或腫瘤壞死因子拮抗劑(TNF antagonist)治療而反應不佳或無法耐受的患者。在這些患者中，若病患對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予 Actemra 單獨治療。2. 全身性幼年型原發性關節炎 (SJIA) -Actemra 適用於治療 2 歲(含)以上的活動性全身性幼年型原發性關節炎患者，且對 NSAID 及類固醇治療反應不佳或無法耐受者。

ADR：Upper respiratory tracts infection, abnormal liver function, headache, hypertension.

禁忌：對此成份過敏者。

備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。

- 926059 4560 Ustekinumab (Antipsoriatic Agent) 冷藏
 'Stelara' 45mg/0.5ml/prefilled syringe
 Usual Dose: SC.
 ≤ 100 kg, 45 mg at 0- and 4 wks, followed by 45 mg every 12 wks.
 > 100 kg: 45 mg or 90 mg at 0- and 4 wks, followed by 45-90 mg
 every 12 wks.
 孕婦安全分級：B
 衛生署適應症：適用於治療適合接受光療法或全身性治療的中至重度斑塊性
 乾癬成人患者(18 歲(含)以上)。
 ADR：Infection, headache, fatigue, nasopharyngitis, ecchymosis at injectin site.
 禁忌：對此成份過敏者、活動性感染症患者。
 備註：原臨購品項，第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。
- 966659 6090 Zoledronic acid (Hormones Miscellaneous Agent) 腎
 'Aclasta' 5mg/100ml/btl
 Usual Dose: IVD, 5 mg every 1 yr.
 孕婦安全分級：D
 注意事項：建議輸注時間大於 15 分鐘；不可與含鈣溶液或其他靜脈注射藥
 物混合使用。
 衛生署適應症：1. 治療骨佩吉特氏病 (Paget's disease of bone)。2. 治療停經
 後婦女的骨質疏鬆症，以降低發生髖關節、脊椎與非脊椎性骨折的機率，
 並增加骨密度。3. 男性骨質疏鬆症之治療，以增加骨密度。4. 適用於治
 療及預防男性與女性因類固醇引起之骨質疏鬆症；這些病患為剛開始使用
 或持續使用每日劑量相當於 7.5 mg prednisolone 或更高劑量的全身性類固
 醇，且預期將持續使用類固醇至少 12 個月者。5. 預防停經後婦女的骨質
 疏鬆症。
 ADR：Influenza, hypocalcemia, injection site redness/swelling/pain, fatigue, bone
 pain, myalgia, fever, nausea, headache.
 禁忌：懷孕、授乳、低血鈣、對此成份或 Biphosphonate 過敏者。
 備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。