

成醫藥誌

Pharmacy Forum

發行人：林 炳 文
 總編輯：周 辰 熹
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

- | 料 號 | 藥 理 | 藥 品 名 稱 |
|--------|------|---|
| 901442 | 7210 | <p>Travoprost/Timolol</p> <p>'Duotrav' oph solution 0.04/5mg/ml, 2.5ml/btl</p> <p>Usual dose: 1 gtt once daily.</p> <p>注意事項：投藥後 15 分鐘才可重新配戴隱形眼鏡。</p> <p>孕婦安全分級：C</p> <p>適應症：對乙型阻斷劑或前列腺素類似物眼用製劑治療反應不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓患者，用以降低其眼內壓。</p> <p>ADR：Eye irritation, ocular hyperemia, dizziness, headache, irregular heart rate, bronchospasm.</p> <p>禁忌：對 travoprost, timolol 或任一賦形劑過敏者、呼吸道疾病(如支氣管氣喘、重度 COPD)、sinus bradycardia、二至三度房室傳導障礙、心衰竭或心源性休克、重度過敏性鼻炎及支氣管過度敏感、角膜萎縮、對其他乙型阻斷劑過敏。</p> <p>備註：第99次藥委會同意列入本院處方用藥，並刪除Unoprostone (Rescula®) 0.12%, 5ml/btl。</p> |
| 849647 | 7290 | <p>Polyethylene Glycol + Propylene Glycol Lubricant</p> <p>'Systane Ultra' oph solution, 10ml/btl</p> <p>Each ml contains:</p> <p>Polyethylene glycol 4004.0 mg</p> <p>Propylene glycol3.0 mg</p> <p>Usual Dose: 1-2 gtt as needed.</p> <p>注意事項：開封 30 天後請勿繼續使用。</p> <p>適應症：暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。</p> <p>ADR：Eye irritation/redness/swelling, blurred vision, allergy.</p> |

- 347024 6340 Everolimus 肝 不宜磨
 'Afinitor' 5mg/tab
 Usual Dose: 10 mg daily at the same time.
 注意事項：不可咀嚼或咬碎錠劑。
 孕婦安全分級：D
 適應症：治療使用 sunitinib 或 sorafenib 治療失敗之晚期腎細胞癌病患。
 ADR：Stomatitis, infection, asthenia, fatigue, cough, diarrhea.
 禁忌：對主成份、rapamycin 衍生物或任何賦形劑過敏者。
 備註：第102次藥委會同意列入本院處方用藥。
- 684953 3350 Pemetrexed 腎
 'Alimta' 100mg/vial
 Usual Dose: IVD.
 Malignant pleural mesothelioma: 500 mg/M2 IVD over 10 min on day 1 of each 21-day cycle. Cisplatin should follow, beginning 30 min after the completion of pemetrexed.
 Non-small cell lung cancer: 500 mg/M2 IVD over 10 min on day 1 of each 21-day cycle.
 Premedications are recommended:
 Dexamethasone: 4 mg (or equivalent) po bid on day 0-2.
 Folic acid: 350-1000 mcg qd from day (-5) to day 21.
 Vit B12: 1000 mcg IM one wk prior to treatment, then every 3 cycles.
 注意事項：建議以 0.9%生理食鹽水注射液配製與稀釋。
 孕婦安全分級：D
 適應症：1.與 cisplatin 併用於治療惡性肋膜間質細胞瘤。 2.單一藥物是治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（顯著鱗狀細胞組織型除外）之第二線治療用藥。 3.併用 cisplatin 是治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（顯著鱗狀細胞組織型除外）之第一線化療用藥。4.局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（顯著鱗狀細胞組織型除外）病人接受四個週期含鉑藥物的第一線化療後疾病並未惡化之維持療法，含鉑藥物必須為 gemcitabine、paclitaxel 或 docetaxel 與 platinum 之組合，但不包含使用 Alimta 之 regimen。
 ADR：Oropharyngitis, loss of appetite, diarrhea, nausea, vomiting, rash, constipation, dyspnea, fatigue, chest pain, myelosuppression.
 禁忌：對 pemetrexed 或其賦形劑過敏者。
 備註：第102次藥委會同意列入本院處方用藥。
- 826050 4822 Meglumine & Sodium Ioxitalamate 避光
 'Telebrix 35' Iodine: 350mg/ml, 50ml/vial

Usual Dose: The dose must be adapted to the examination and the regions to be contrasted, as well as to the weight and renal function of the subject.

適應症：血管心臟攝影(心室攝影、冠狀動脈攝影)、數位化分層血管攝影(Digital subtraction angiography)、靜脈內尿道攝影(Intravenous urography)、電腦斷層。

ADR：Sensation of flushing or warmth, allergy, nausea, vomiting.

禁忌：骨髓攝影。

184522 7551 Chlorpromazine 肝
'Winsumin' 50mg/tab

Usual Dose:

Antipsychotic:

Adult: 50-400 mg/day, up to 1-2 g/day.

Child: 0.5-1 mg/kg q4-6h.

Antiemetic:

Adult: 10-25 mg q4-6h.

Child: 0.5-1 mg/kg q4-6h.

孕婦安全分級：C

適應症：躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙。

ADR：Akathisia, extrapyramidal syndrome, dizziness, blurred vision, constipation, nasal congestion, photosensitivity.

備註：第 102 次藥委會決議，同意神經精神用藥小組建議重新進用。

202121 7531 Clomipramine
'Clopran' 25mg/tab

Usual Dose:

Adult: 25-250 mg/day.

Child(≥ 10 yr): 20-100 mg/day. Max. 200 mg/day or 3 mg/kg (whichever is less).

孕婦安全分級：C

適應症：憂鬱病。

ADR：Xerostomia, loss of appetite, tachycardia, dizziness, headache, tremor.

禁忌：對此成份過敏、併用 MAOI。

備註：第 102 次藥委會決議，同意神經精神用藥小組建議重新進用。

421657 7551 Haloperidol 避光
'Haldol Decanoas' 50mg/ml/amp

Usual Dose: IM.

Initially, 10-15 times the previous daily dose in oral haloperidol equivalents q4w (initial 25-75 mg, max.100 mg).The max. volume per injection site should

not exceed 3 ml.

注意事項：1.EPS (extrapyramidal reactions)通常發生於剛開始服藥的時候，尤其是 high-potency 的品項較易出現。2.Low-potency 的品項較會有 alpha antiadrenergic 及 anticholinergic 的作用。3.若是病患有高膽色素血症 (hyperbilirubinemia)或黃疸現象時應停止原先使用的藥品而改用化學結構不同的另一類抗精神病藥。4.對於老年人及糖尿病人之起始劑量應降低。

孕婦安全分級：C

適應症：躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

ADR：Somnolence, blurred vision, dry mouth, postural hypotension, weight gain, rash, insomnia, constipation.

禁忌：CNS 因酒精或其他抗憂鬱藥物造成的抑制狀態、Parkinsonism、對此成份過敏、基底核損傷時。

備註：第 102 次藥委會決議，同意神經精神用藥小組建議重新進用。