



發行人：楊 俊 佑
總編輯：張 慧 真
主 編：藥品諮詢組
地 址：台南市勝利路 138 號
電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
八十年十月創刊
新聞局出版事業登記證
局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號	藥 理 分類號	藥品名稱
802749	7815	Salmeterol + Fluticasone propionate (Corticosteroids Compound Preparation) 'Seretide 500' accuhaler 50/500mcg/dose, 60dose/btl Usual Dose: Adult & Child ≥ 12 yr, Max. 1 dose bid. 孕婦安全分級：C 衛生署適應症：成人及 12 歲以上青少年之嚴重氣喘及中至重度($FEV_1 < 60\%$) 慢性阻塞性肺部疾病之維持性治療。 ADR：Oral candidiasis, tachycardia, tremor, headache, hoarseness. 禁忌：對此成份過敏者。 備註：第 109 次藥委會同意列入本院處方用藥，並取代 Flixotide Accuhaler。
238024	5730	Dabigatran Etxilate (Anticoagulant) 腎 肝 不宜磨 'Pradaxa' 110mg/hard cap Usual Dose: 110-150 mg bid. 孕婦安全分級：C 衛生署適應症：預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞。 ADR：Bleeding, dyspepsia, GI hemorrhage, anemia. 禁忌：活躍的病理性出血、對此成份過敏、重度腎功能受損、出血性癥候、 出血傾向、自發性或藥物性止血功能障礙、出血風險之器質性病變。 備註：第 109 次藥委會同意列入本院處方用藥。
789444	6953	Rotigotine (Dopamine Receptors Agonist) 冷藏 'Neupro' 6mg/24h/patch Usual Dose: One patch once daily. Max. recommended dose is 8 mg/24h. 孕婦安全分級：C 衛生署適應症：原發性帕金森氏症。

ADR: Somnolence, dizziness, headache, nausea, vomiting, skin redness, swelling, pruritis, hypotension.

禁忌：對此成份過敏、進行核磁共振造影或心臟電擊者。

備註：第 109 次藥委會同意列入本院處方用藥。

742829 6910 Pregabalin (Anticonvulsant) 腎

'Lyrica' 75mg/hard cap

Usual Dose:

Postherpetic neuralgia & partial seizure: 150-300 mg/day in 2-3 divided doses.

Max. 600 mg/day.

Fibromyalgia: Initial, 75 mg bid; usual effective dose, 300-450 mg/day in 2 divided doses. Max. 450 mg/day.

Diabetic peripheral neuropathy - Neuropathic pain: Initial, 150 mg/day and increased to a max. dose of 300 mg/day in 2-3 divided doses.

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：帶狀泡疹後神經痛。成人局部癲癇的輔助治療。纖維肌痛 (fibromyalgia)。糖尿病周邊神經病變引起的神經性疼痛。

ADR: Edema, dizziness, somnolence, headache, fatigue, tremor, weight gain, dry mouth, constipation, nausea, vomiting, blurred vision, nasopharyngitis.

禁忌：對此成份過敏、曾使用本品項發生血管性水腫與過敏現象者。

備註：第 109 次藥委會同意列入本院處方用藥，並取代 Gabapentin (Neurontin) 300mg/cap。

526053 6910 Levetiracetam (Anticonvulsant) 腎 肝

'Keppra' 100mg/ml, 500mg/vial

Usual Dose: IVD.

Monotherapy:

Adult and adolescents (>16 yr) : Initially, 250 mg bid, may be increased up to a max. of 1500 mg bid. Dose changes can be made in 250 mg bid increments q2wk.

Add-on therapy:

Adult (>18 yr) and adolescents (12-17 yr) > 50 kg : Initially, 500 mg bid, may be increased up to 1500 mg bid. Dose changes can be made in 500 mg bid increments or decrements q2-4wk.

Child (4-11 yr) and adolescents (12-17 yr) < 50 kg : Initially, 10 mg/kg bid, may be increased up to 30 mg/kg bid.

孕婦安全分級：C

衛生署適應症：暫時不宜或無法口服抗癲癇藥物治療之下列癲癇患者：十六

歲以上病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。
四歲以上孩童或成人病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作，以及十六歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。

ADR：Somnolence, dizziness, headache, anorexia, vomiting, tremor, fatigue.

禁忌：對此成份過敏者。

備註：第 109 次藥委會同意列入本院處方用藥。

- | | | |
|--------|------|---|
| 741327 | 6953 | <p>Pramipexole (Dopamine Receptors Agonist) 腎 不宜磨</p> <p>'Mirapex Prolonged-Release' 1.5mg/PR tab</p> <p>Usual Dose: Initially, 0.375 mg once daily, titrated by 0.75 mg/dose every 5-7 days. Max. 4.5 mg once daily.</p> <p>孕婦安全分級：C</p> <p>衛生署適應症：治療巴金森氏症的徵候及症狀。</p> <p>ADR：Constipation, postural hypotension, somnolence, dizziness, nausea.</p> <p>禁忌：對此成份過敏者。</p> <p>備註：第 109 次藥委會同意列入本院處方用藥，並取代 Mirapex 1mg/tab。</p> |
| 284129 | 1250 | <p>Dronedarone (Anti-Arrhythmics: Class III) 肝</p> <p>'Multaq' 400mg/tab</p> <p>Usual Dose: 400 mg bid.</p> <p>孕婦安全分級：X</p> <p>衛生署適應症：Multaq 適用於最近 6 個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動 (AF)或心房撲動(AFL)，且目前處於竇性節律(sinus rhythm)狀態或即將接受治療成為正常節律的患者，可降低病患發生心血管疾病而住院的風險：一年齡≥ 70 歲以上，曾有過心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)之病患；一$65 \leq$年齡< 70 歲，且帶有下列心血管相關危險因子之一的患者（例如：高血壓、糖尿病、曾發生過腦血管意外、左心房直徑$\geq 50\text{mm}$ 或左心室射出率【LVEF】$< 40\%$）。</p> <p>ADR：Diarrhea, nausea, vomiting, abdominal pain, dyspepsia, asthenia, bradycardia, rash, dermatitis.</p> <p>禁忌：NYHA 分類為第 IV 類的心衰竭患者、NYHA 分類為第 II-III 類的心衰竭患者且最近曾因心臟代償不全而住院或被轉介至心衰竭專科門診者、第二或第三級房室傳導阻滯或病竇症候群患者、嚴重肝功能不全、懷孕、哺乳。</p> <p>備註：第 109 次藥委會同意列入本院處方用藥。</p> |

401053 4850 Gadoxetate disodium (Magnetic Resonance Radiopaques)
'Primovist' 0.25mmol/ml, 10ml/syringe
Usual Dose: 0.1 ml/kg (corresponding to 0.025 mmol/kg)
孕婦安全分級：C
注意事項：嚴重腎功能不全者，應注意可能引起腎生性之全身性纖維病變
(Nephrogenic systemic fibrosis)。
衛生署適應症：適用於 T1 加權掃描核磁造影時，偵測肝臟局部病灶及提供
病灶特性資訊。
ADR：Injection site pain, headache, dizziness, nausea, vomiting, allergic reaction.
禁忌：對此成份過敏者。
備註：第 110 次藥委會同意列入本院處方用藥。