

成醫藥誌

Pharmacy Forum

發行人：楊 俊 佑
 總編輯：張 慧 真
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號	藥 理 分類號	藥品名稱
526455	6030	Leuporelin acetate (Antiandrogen and Its Combined Product) 'Leuplin Depot 3M' 11.25mg/syringe Usual Dose: SC, 11.25 mg every 3 months. 孕婦安全分級：X 許可證適應症：前列腺癌紓解治療、子宮內膜異位症、因子宮肌瘤引起之經血過多及貧血而預計進行手術切除者。 ADR：Injection site pain/induration, dizziness, flushing, headache, arthralgia. 禁忌：對此成份過敏、懷孕、哺乳、未經診斷的陰道異常出血。
141442	4560	Calcipotriol/Betamethasone 腎 肝 'Xamiol' gel, 30g/btl Each g contains: Calcipotriol.....50 mcg Betamethasone.....0.5 mg (as dipropionate) Usual Dose: 1-4 g once daily for 2- 8 wks; Max. 15 g daily, 100 g weekly. 注意事項： 1. 使用前將瓶子搖一搖，使用後不要立刻洗頭髮。 2. 使用後洗手，以免擦到患部以外皮膚造成刺激。 孕婦安全分級：C 許可證適應症：治療頭皮牛皮癬、非頭皮部位之輕度至中度尋常性牛皮癬。 ADR：Rash, dermatitis, skin atrophy, photosensitivity, telangiectasia. 禁忌：對此成份過敏或鈣代謝失調、點狀/紅皮性/脫落性/膿疱型之乾癬、嚴重肝或腎功能不全者。
581228	5490	Mesalazine 飯前 腎 肝 'Asacol' 800mg/gastro-resistant tab 不宜磨

Usual Dose:

Adult:

Acute disease: 2400 to 4800 mg/day in divided doses.

Maintenance therapy: 1600 to 2400 mg/day in divided doses.

Child $\geq$ 6 yr:

Acute disease: 30-50 mg/kg/day in divided doses. Max. 75 mg/kg/day, up to 4000 mg/day.

Maintenance therapy: 15-30 mg/kg/day in divided doses, up to 2000 mg/day.

注意事項：

1. 若有證據顯示腎功能不全，或發生無法耐受之急性症狀，如：痙攣、腹痛、發燒、嚴重頭痛或出疹症狀，應立即停止治療。
2. 建議在 Asacol 起始使用前及治療期間執行血液檢查。

孕婦安全分級：B

許可證適應症：治療潰瘍性結腸炎及其持續治療以防止復發。

ADR：Rash, burping, abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, headache.

禁忌：對此成份或 Salicylates 過敏、嚴重肝或腎功能不全、小於 2 歲兒童。

727220 6610 Potassium Citrate 腎 不宜磨
'Urocit-K' 10mEq/1080mg/ER tab

Usual Dose: Severe hypocitraturia (urinary citrate < 150 mg/day), 60 mEq/day in 3-4 divided doses. If urinary citrate > 150 mg/day, 30 mEq/day in 3 divided doses. Max. 100 mEq/day. Dosage should be adjusted by 24 hr urinary citrate and/or urinary pH.

注意事項：

1. 服用本品治療時，須限制鹽份的攝取，並建議攝取大量液體。
2. 與食物併服會減少胃腸不適的症狀。

孕婦安全分級：C

許可證適應症：鈣石症引起之腎小管酸中毒，任何病理所引起的低檸檬酸尿、草酸鈣腎石症和尿酸結石(有或無鈣結石)。

ADR：Abdominal discomfort, vomiting, diarrhea, nausea.

禁忌：高血鉀、胃腸道障礙、尿道感染、腎功能不全者。

060656 6630 Glucose, Amino acid, Fat Emulsion 腎 肝
'SmofKabiven Peripheral' 1448ml/bag

Each 1448 ml solution contains:

Glucose solution 13%....788 ml

Amino acid solution.....456 ml

Lipid emulsion 204 ml

Ingredient contents (mg/dL)		Ingredient contents (mg/dL)	
Essential amino acids		Non-essential amino acids	
Isoleucine	160	Arginine	380
Leucine	230	Alanine	440
Lysine	210	Glycine	350
Methionine	130	Proline	350
Phenylalanine	160	Serine	210
Threonine	140	Tyrosine	12
Tryptophan	63		
Valine	200		
Histidine	93		
Electrolytes (mmol)			
Na ⁺	36		
K ⁺	28		
Ca ²⁺	2.3		
Mg ²⁺	4.6		
Zn ²⁺	0.03		
Cl ⁻	32		
HPO ₄ ²⁻	11.9		
Acetate ⁻	96		
Total Amino Acids (g)		46	
Total Nitrogen (g)		7.4	
Caloric Value (Kcal/L)		1000	
Osmolarity (mOsm/L)		850	

Usual Dose: IVD. Average nitrogen requirements are 0.1-0.2 g/kg/day (20-40 ml/kg/day), max. daily dose is 40 ml/kg/day.

孕婦安全分級：C

許可證適應症：靜脈營養輸注，適用於無法由口腔進食或經腸道獲取足夠營養，或禁止由口腔及腸道進食之成年患者。

ADR：Phlebitis, increase in body temperature, chills, nausea, vomiting.

禁忌：對魚、蛋、大豆或花生的蛋白質過敏、對本品或賦形劑過敏、嚴重高血脂症、重度肝功能不全、嚴重血液凝集疾病、先天性胺基酸代謝異常、重度腎功能不全且未進行透析治療、急性休克、高血糖症。

783759 6630 Fat Emulsion, Refined Olive Oil 80%/Refined Soya Bean Oil 20%
'Clinoleic' 20%, 250ml/bag

Usual Dose: IVD.

Adult: 1-2 g/kg/day. Infusion rate: 0.1 g/min (0.5 ml/min) for 10 min then gradually increased after 30 min, up to 0.15 g/kg/hr (0.75 ml/kg/hr).

Child: Max. 3 g/kg/day. Infusion rate: <0.15 g/kg/hr.

孕婦安全分級：C

許可證適應症：作為採用靜脈輸注營養病人的脂肪來源。

ADR：Chills, headache, dyspnea, abnormal liver function.

禁忌：對主成份或任一添加物（如蛋或大豆蛋白）過敏、嚴重血脂異常、嚴重敗血病、嚴重的肝疾病、血液凝固異常、血栓性靜脈炎、心肌梗塞。

041059 6630 N(2)-L-alanyl-L-glutamine 腎 肝
'Kinpomin' 200mg/ml, 100ml/btl
Usual Dose: IVD, 0.3-0.4 g/kg/day (1.5-2.0 ml/kg/day). Max. 0.4 g/kg/day (2.0 ml/kg/day). Infusion rate < 0.1 g/kg/hr at a max. conc. of 3.5%.

孕婦安全分級：C

注意事項：

1. 為高濃度輸注液不適合直接使用，必須以至少五倍以上可相容溶液之體積混合後靜脈輸注。
2. 混合後之滲透壓若大於 800 mOsmol/L 時，應由中央靜脈輸注。
3. 給藥劑量應列入氨基酸總量(最大劑量：2 g/kg/day)計算，且不應超過氨基酸總量的 20%、使用勿超過三週。

許可證適應症：做為一般非經腸道營養須額外補充 Glutamine 的病人(如異化過度或新陳代謝過度之病人)氨基酸溶液之補充品。

ADR：Chills, nausea, vomiting.

禁忌：對此成份過敏、嚴重腎功能不全($\text{Ccr} < 25 \text{ ml/min}$)、嚴重肝功能不全、嚴重代謝性酸血症。

126348 7210 Brinzolamide/Timolol
'Azarga' 10/5mg/ml, 5ml/btl
Usual Dose: 1gtt bid.

注意事項：

1. 使用前應先摘除隱形眼鏡，投藥後 15 分鐘才可重新配戴。
2. 不建議與口服之 carbonic anhydrase inhibitor 併用。
3. 使用前需先搖勻。開瓶後請於四星期內用完。

孕婦安全分級：C

許可證適應症：用於治療曾使用單方治療效果不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓成人患者，以降低其眼內壓。

ADR：Taste disorder, blurred vision, eye irritation, foreign body sensation in eye.

禁忌：對此成份或磺胺藥過敏、支氣管氣喘或嚴重慢性肺阻塞、竇性徐脈、2 或 3 級房室阻斷、心衰竭或心源性休克、重度過敏性鼻炎及支氣管過度敏感、對其他乙型阻斷劑過敏、血氣過多性酸血症、嚴重腎損傷者。

246454 7240 Dexamethasone intravitreal implant
'Ozurdex' 0.7mg/vial
Usual Dose: IVI, 0.7 mg every 6 months.

注意事項：

1. 僅限玻璃體內使用。
2. 不建議雙眼同時接受注射。
3. 若裝置注射器的鋁箔袋封口破損，請勿使用。鋁箔袋一旦打開後，應立即使用。

孕婦安全分級：C

許可證適應症：用於 18 歲以上，因 BRVO (Branch Retinal Vein Occlusion) 或 CRVO (Central Retinal Vein Occlusion) 導致黃斑部水腫，使視力下降至 0.4 以下達 6 週以上者，且視網膜黃斑厚度經眼部電腦斷層掃描 (Optical Coherence Tomography, OCT) 檢測 $\geq 300\mu\text{m}$ 且無下列情形者：1. 青光眼確診者。2. 曾因使用 steroid 而使眼壓上升 10 mmHg 或達 25 mmHg 者。3. 曾有青光眼病史，或視神經盤或視野有青光眼變化者。用於影響眼後房的非感染性葡萄膜炎的治療。(說明：以下情況不建議使用：1. 眼球感染或眼周感染。2. 曾有眼球疱疹感染病史者。3. 患有活動性或不活動性 toxoplasmosis 患者。4. 明顯鞏膜變薄或鞏膜突出或有可能因使用此劑型導致鞏膜破裂者。5. 使用抗凝血劑或有可能因使用此劑型導致玻璃體內出血者。6. 曾對本品任何成分過敏者。)

ADR：Elevation of intraocular pressure, eye irritation, conjunctival hyperemia, cataract.

禁忌：對此成份過敏、具有或疑似眼部或眼周感染、無法單靠藥物有效控制的晚期青光眼者。