



發行人：林 炳 文
 總編輯：周 辰 熹
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號 藥 理 藥品名稱
 分類號

129759 3310 Busulfan (Alkylating Agent) 冷藏

'Busulfex' 60mg/10ml/vial

Usual dose: IVD via a central venous catheter over 2 hr.

Conditioning regimen before BMT (dose based on ideal body weight or actual body weight, whichever is lower):

Adult: 0.8 mg/kg q6h × 16 doses.

Child: > 12 kg, 0.8 mg/kg q6h × 16 doses; ≤ 12 kg, 1.1 mg/kg × 16 doses.

Phenytoin or clonazepam should be administered prophylactically during and for at least 48 hr following completion of busulfan.

孕婦安全分級：D

243223 3390 Dasatinib (Anti-Neoplastic Miscellaneous Agent) 不宜磨

'Sprycel' 50mg/tab

Usual dose: 70 mg bid.

注意事項：1. 建議整粒吞服，以防止其他人員暴露於活性藥物下。

2. 無肝功能不全病患使用資訊，但因主要由肝臟代謝，故建議審慎使用。

孕婦安全分級：D

600951 7890 Omalizumab (Respiratory Miscellaneous Agent) 冷藏

'Xolair' 150mg/vial

Usual dose: SC only.

Adult & Child ≥ 12 yr: 150-375 mg q 2-4 wk; dosage determined by IgE level before first treatment and body weight; do not administer more than 150 mg into one injection site.

孕婦安全分級：B