

成醫藥誌



Pharmacy Forum

發行人：林炳文
 總編輯：周辰熹
 主編：藥品諮詢組
 地址：台南市勝利路138號
 電話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新藥通知

料號	藥理分類號	藥品名稱
668725	5460	Otilonium bromide (Anticholinergics and Antispasmodics) 'Cation' 40mg/tab Usual Dose: 1 tab bid-tid. 注意事項：青光眼、攝護腺肥大或幽門狹窄者需審慎使用。 適應症：腸躁症腹痛症狀之緩解。 ADR：Nausea, vomiting, dizziness, headache, abdominal pain.
761836	5450	Psyllium hydrophilic (Laxatives, Cathartics and Bulk-forming Agents) 'Konsyl' 6g/pack Usual dose: Adult: One pack 1 to 3 times a day. Child > 6 yr: Half of the adult dose. 注意事項：需與足量水服用，建議一包以 240 ml 水併服，否則易引起胸痛、嘔吐、口水過多、容易噎到等食道阻塞之症狀，故不適用於限水患者。 孕婦安全分級：B 適應症：軟便。 ADR：Diarrhea. 禁忌：胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心、腸道潰瘍/狹窄/沾黏者。
782855	6980	Ramosetron (Drugs Used in Vertigo and Vomiting) 避光 'Setoral' 0.3mg/2ml/amp Usual dose: IV, 0.3 mg qd. If a sufficient response is not achieved, an additional 0.3 mg dose may be given. Max. 0.6 mg/day. 孕婦安全分級：C 適應症：預防化學療法引起之急性噁心和嘔吐。

ADR : Abnormal liver function, diarrhea, constipation, anaphylactic shock, seizure attack.

備註：第99次藥委會同意列入本院處方用藥，並刪除Zofran Inj。

824842 5150 Sodium Monofluorophosphate/Sodium Fluoride (Throat and Oral Cavity Preparations)

'Scodyl Dental Gel' 300g/btl

Usual Dose:

Prevention of dental caries: Bid use, add the gel to a fluoride-containing toothpaste.

Multiple caries: Dosage to be determined by the dentist.

適應症：預防牙齒蛀齦。

824749 5150 Sodium Monofluorophosphate/Sodium Fluoride (Throat and Oral Cavity Preparations)

'Standard-Fluor Dental Gel' 2.4% F, 12.5ml/tube

Usual Dose: Apply every 3-6 months.

注意事項：1.塗氟4小時內不可咀嚼食物或口香糖。

2.開封後請於3個月內用完。

適應症：預防牙齒蛀齦。

105541 5150 Benzocaine (Throat and Oral Cavity Preparations)

'Pancaine' Orabase 20%, 30g/btl

Usual Dose: Apply topically to affected areas up to 4 times daily.

孕婦安全分級：C

適應症：牙痛、牙齦腫痛時之局部麻醉。

228248 7290 Cyclosporin (OPH Miscellaneous agents)

'Restasis' 0.05%, 0.4ml/vial; 30vial/box

Usual Dose: 1 gtt bid.

注意事項：使用前需輕輕搖勻，與人工淚液須間隔15分鐘；開封使用後即應丟棄。

孕婦安全分級：C

適應症：治療嚴重乾性角結膜炎(Schirmer test without anesthesia < 5mm/5min) 併角結膜上皮病變患者之發炎反應，但在目前使用局部抗發炎藥物或使用淚點塞病患未見療效者。

ADR : Burning and stinging in eye, lacrimation, foreign body sensation, visual disturbances.

備註：每盒包裝含30支，核發時以30支為給藥單位，不拆盒。

523626 6610 Lanthanum carbonate (Replenishers and Regulators of Water and Electrolytes)
'Fosrenol' 750mg/tab

Usual dose: Starting doses according to serum phosphorus concentration listed below:

Phosphorus conc.	Initial dose
1.8-2.4 mmol/L	750 mg/day
2.4-2.9 mmol/L	1500 mg/day
> 2.9 mmol/L	2250 mg/day

注意事項：須咬碎服用，不可整粒吞服。

孕婦安全分級：C

適應症：適用於正在進行血液透析或連續性腹膜透析(CAPD)的慢性腎衰竭病人之高磷酸鹽血症的第二線治療。

ADR：Nausea, vomiting, abdominal pain, constipation, diarrhea, dyspepsia, flatulence, hypercalcemia.

備註：第 99 次藥委會同意列入本院處方用藥，並刪除 Renagel，且限腎臟科醫師使用。

6340 Tacrolimus PR (Immunomodulators) 不宜磨 飯前 腎 肝

860222 'Advagraf' 0.5mg/cap

860325 'Advagraf' 1mg/cap

Usual dose: Dose is titrated based on whole blood trough level and assessment of rejection & tolerability. The doses are usually reduced in the post-transplant period.

Kidney transplantation: Initially, 0.2-0.3 mg/kg/day started within 24 hr of transplant.

Liver transplantation: Initially, 0.1-0.2 mg/kg/day started within 12-18 hr of transplant.

注意事項：與 Prograf 之劑量轉換為每日總劑量 1：1 換算。

孕婦安全分級：C

適應症：成人肝、腎移植之第一線用藥或成人肝、腎移植 Cyclosporin 無效之第二線用藥。

ADR：Tremor, headache, diarrhea, nausea, renal impairment, hyperglycemia, hyperkalemia, hypertension, insomnia.

禁忌：對此成份或 Macrolides 過敏者。