



| | |
|------|--|
| 公告日期 | 2026/4/9 |
| 異動類別 | 藥品變更 |
| 異動原因 | 年度招標 |
| 異動描述 | <p>Methimazole 5mg/tab (Methimazole[®])甲硫嗎唑錠因年度招標異動，改以Methimazole 5mg/tab (Lica[®])利甲錠替代。</p> <ul style="list-style-type: none"> 舊品用罄，啟用新品。 |

| 異動內容 | | |
|--------|---|---|
| | 舊藥品 | 新藥品 |
| 料號 | 583521 | |
| 學名 | Methimazole | |
| 商品名 | Methimazole | Lica |
| 中文名 | 甲硫嗎唑錠 | 利甲錠 |
| 主成份及含量 | 5mg/tab | |
| 製造廠名稱 | 強生化學製藥廠股份有限公司 (強生) | 瑞士藥廠股份有限公司新市廠 (瑞士藥廠) |
| 產地 | 臺灣 | 臺灣 |
| 健保代碼 | AC501821G0 | AC042211G0 |
| 外觀/圖檔 |  |  |
| 用法 | 口服 | |

| | |
|------|--|
| 小孩劑量 | Infants, Children, and Adolescents: Hyperthyroidism: Initial: 0.4 mg/kg/day PO in 3 divided doses Usual maintenance: 0.2 mg/kg/day PO in 3 divided doses (50% of initial) Graves disease: 0.2 to 0.5 mg/kg/day PO once daily or in 2 divided doses (range: 0.1 to 1 mg/kg/day) |
| 成人劑量 | Hyperthyroidism: Initial: 15-60 mg/day PO in 2-3 divided doses (depending on severity of disease) Usual maintenance: 5-15 mg/day PO once daily or in 2-3 divided doses |
| 副作用 | |