



公告日期	2026/2/3
異動類別	藥品變更
異動原因	年度招標
異動描述	Lactulose 60mL/btl (Lactulose Liquid[®])樂可樂舒液劑因年度招標異動，改以Lactulose syr 60mL/btl (Lactul[®])樂多糖漿（拉特樂斯）替代。 舊品用罄，啟用新品。

異動內容		
	舊藥品	新藥品
料號	521032	
學名	Lactulose	
商品名	Lactulose Liquid	Lactul
中文名	樂可樂舒液劑	樂多糖漿（拉特樂斯）
主成份及含量	60mL/btl	
製造廠名稱	順華藥品工業股份有限公司三峽工廠 (順華)	杏輝藥品工業股份有限公司 (杏輝)
產地	臺灣	臺灣
健保代碼	AA47792151	AB39701151
外觀/圖檔		
用法	口服	
小孩劑量	Constipation: 1-3 mL/kg/day PO divided once or twice daily (Max: 60 mL/day) Portal systemic encephalopathy: <u>Infants:</u> 2.5-10 mL/day in divided doses; adjust dosage to produce 2 to 3 stools/day <u>Children and Adolescents:</u> 40-90 mL/day in divided doses; adjust dosage to produce 2 to 3 stools/day	
成人劑量	Portal systemic encephalopathy: <u>PO:</u> Acute, initially, 30-45 mL/hr, then reduced to TID-QID when laxation occurs; maintenance, 30-45 mL TID-QID, adjusted Q1-2D to produce 2-3 soft stools daily. <u>Rectal:</u> 300 mL is mixed with 700 mL water or saline, retained for 30-60 min, may be repeated Q4-6H. Chronic constipation: PO, 15-30 mL/day.	
副作用		