




公告日期	2026/7/17
異動類別	藥品變更
異動原因	製造廠變更
異動描述	Remimazolam inj 20mg/vial (Byfavo[®]) 倍佛若凍晶乾燥注射劑廠商來文，自批號HN2005P起，製造廠/產地由「Patheon Italia SpA/ Italy」變更為「Hana Pharm/ Korea」，藥品包裝變更。 舊品用罄，啟用新品。

異動內容		
	舊藥品	新藥品
料號	783952	
學名	Remimazolam	
商品名	Byfavo	
中文名	倍佛若凍晶乾燥注射劑	
主成份及含量	20mg/vial	
製造廠名稱	Patheon Italia SpA (Patheon)	
產地	義大利	
健保代碼		
外觀/圖檔		
用法	靜脈滴注	

成人劑量	1.成人醫療處置時鎮靜用 Induction of procedural sedation: adults patients: IV: 5 mg over 1 min. ASA III or IV patients: IV: 2.5 to 5 mg over 1 min based on general condition of patient. Maintenance of procedural sedation: adults patients: IV: 2.5 mg over 15 secs as needed; at least 2 mins must elapse prior to administration of any supplemental dose. ASA III or IV patients: IV: 1.25 to 2.5 mg over 15 secs as needed; at least 2 mins must elapse prior to administration of any supplemental dose. *ASA = American Society of Anesthesiologists Physical Status classification System 2.成人全身麻醉誘導與維持 induction:6 mg/min，觀測病人反應直到病人喪失意識進入麻醉。需要時可調升至最大達 12 mg/min。(多數成人病人需使用 10-40 mg) maintenance:透過連續輸注BYFAVO以維持麻醉。 維持麻醉的建議起始劑量為 1 mg/min，(range:0.1~2.5 mg/min) 視臨床狀況需要，在持續輸注期間可給予bolus injection來維持麻醉。每次bolus建議劑量為6 mg，注射時間超過 1 min；60 分鐘內最多可給予三次bolus，每次注射前必須間隔至少5mins。 預期手術即將結束時(例如，結束前 15 mins)，可逐漸減少BYFAVO劑量，以加速病人麻醉後恢復。
副作用	