





公告日期	2026/8/12
異動類別	藥品變更
異動原因	包裝變更
異動描述	Amikacin inj 500mg/2mL/vial (Acemycin®)時欣黴素注射液廠商來文，自批號A001起，外盒標示變更，藥品包裝變更。 舊品用罄，啟用新品。

異動內容		
	舊藥品	新藥品
料號	061550	
學名	Amikacin	
商品名	Acemycin	
中文名	時欣黴素注射液	
主成份及含量	500mg/2mL/vial	
製造廠名稱	永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠 (永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠)	
產地	臺灣	
健保代碼	AC28477212	
外觀/圖檔	 	 
用法	靜脈滴注	
小孩劑量	<i>Please check serum level, and adjust dose accordingly.</i> <i>Avoid peak serum conc > 35 mcg/ml & trough conc > 10 mcg/ml.</i> IM or IVD (> 1-2 hr for Infant) Neonate: 17.5-18 mg/kg/dose Q24H Infants, Children, and Adolescents: <u>Once-daily dosing</u> (preferred): 15-30 mg/kg/dose IV, IM once daily <u>Conventional dosing</u>: 15-22.5 mg/kg/day divided IV, IM Q8H-Q12H	

成人劑量	<i>Please check serum level, and adjust dose accordingly.</i> <i>Avoid peak serum conc > 35 mcg/ml & trough conc > 10 mcg/ml.</i> IM or IVD (> 30-60 min) Traditional dosing: 5 mg/kg IM, IV Q8H or 7.5 mg/kg Q12H Once-daily dosing: 15-20 mg/kg IV once daily (Max: 1500 mg/day)
副作用	