



公告日期	2026/3/13
異動類別	藥品變更
異動原因	年度招標
異動描述	Micafungin inj 50mg/vial (Mycamine [®])米開民注射劑因年度招標異動，改以Micafungin 50mg/vial (Myfungin)米方淨凍晶注射劑替代。 舊品用罄，啟用新品。

異動內容		
	舊藥品	新藥品
料號	599957	599854
學名	Micafungin	
商品名	Mycamine	Myfungin
中文名	米開民 注射劑	米方淨凍晶注射劑
主成份及含量	50mg/vial	
製造廠名稱	Patheon Italia SpA (Patheon)	永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠 (永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠)
產地	義大利	臺灣
健保代碼	BC24509248	AC60897248
外觀/圖檔	 	 
用法	靜脈滴注	

小孩劑量	Candidemia: <4 months: 10 mg/kg IVD QD >=4 months: initial 2 mg/kg IVD QD (Max: 100 mg/dose) Esophageal candidiasis: Infants, Children, and Adolescents: (<u>Non-HIV-exposed/-infected</u>) <=30 kg: 3 mg/kg IVD QD >30 kg: 2.5 mg/kg IVD QD (Max: 150 mg/day) Prophylaxis of fungal infection in HSCT recipients: Infants (>=4 months), Children, and Adolescents: 1 mg/kg IVD QD (Max: 50 mg/dose) Candidemia: <4 months: 10 mg/kg IVD QD ?4 months: initial 2 mg/kg IVD QD (Max: 100 mg/dose); may increase to 4 mg/kg/dose (Max: 200 mg/dose) Esophageal candidiasis: Infants, Children, and Adolescents: (<u>Non-HIV-exposed/-infected</u>) ?30 kg: 3 mg/kg IVD QD >30 kg: 2.5 mg/kg IVD QD (Max: 150 mg/dose) Prophylaxis of fungal infection in HSCT recipients: <4 months: 2 mg/kg IVD QD ?4 months: 1 mg/kg IVD QD (Max: 50 mg/dose)
成人劑量	General dose: 100-150 mg IV QD Prophylaxis against invasive fungal infections: 50-100 IV QD
副作用	