



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume32 No.09.1 - 2020/3/5

藥劑部公告

☐ Enbrel PFP 25mg 仿單更新

- 1.不良反應新增：間質性肺部疾病發生頻率0.06%、肝臟酵素升高發生率0.54%(併用methotrexate則為4.18%)、自體免疫性肝炎發生率0.02%(併用methotrexate則為0.24%)。
- 2.外觀除了澄清或略帶不透明，無色至淡黃色，加註'淡棕色'。

☐ Alinamin-F 仿單更新

儲存條件新增：25°C以下儲存。

☐ Letrozole Alvogen 仿單更新

1.警語及注意事項新增：

(1)17歲以下安全性及有效性尚未確立，不建議使用。

(2)確認停經之婦女才可接受letrozole治療。

(3)Letrozole減少雌激素，會導致增加促性腺激素的反饋作用。FSH增加會進而刺激卵泡生長而誘發停經前婦女排卵。

2.不良反應新增：胃炎、背痛。

3.交互作用新增：CYP3A4 及CYP2A6 抑制劑會減少letrozole 的代謝因而增加血漿中letrozole的濃度(詳見仿單)。CYP3A3 的誘導劑可能會增加letrozole 的代謝因而減少血漿中letrozole的濃度(詳見仿單)。

4.藥物動力學修訂：於血漿的擬似最終清除半衰期約介於2-4天(原為2天)。

5.新增臨床試驗之結果：P024(可手術率提升)、P025(反應率提升)、AR/BC2(反應率提升)、ARBC3(整體存活率提升)，詳見仿單。

6.新增安全性資料：Letrozole 以口服方式投予雌性大鼠會導致交配及懷孕比例降低且增加胚胎著床失敗。

☐ Ciproxin仿單更新

1.仿單頁首新增：

Fluoroquinolone類藥品可能與肢體障礙及潛在不可逆嚴重不良反應之發生相關，包括肌腱炎、肌腱斷裂、周邊神經炎及中樞神經系統作用。使用本藥治療下列適應症時，應保留於沒有其他替代治療選擇時：慢性支氣管炎急性惡化、急性非複雜性膀胱炎、非複雜性泌尿道感染、急性鼻竇炎。

2.警語及注意事項新增：

(1)過去使用quinolone或fluoroquinolone類藥品曾發生嚴重不良反應的病人，應避免使用Ciproxin。使用Ciproxin治療上述病人前，應先確認沒有替代治療選擇並謹慎評估效益/風險。

(2)肌腱炎及肌腱斷裂(好發於阿基里斯腱)，有時為雙側，可能在開始使用fluoroquinolone類藥品的48小時內很快發生，也可能甚至在停藥後數個月後才發生。腎功能不良、曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇治療的患者病人可能會增加發生肌腱病變的風險，故使用本藥應避免併用皮質類固醇。

(3)Fluoroquinolone類藥品可能增加癲癇(痙攣)風險、增加顱內壓(假性腦腫瘤)、頭暈和顫抖有關。具其他可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值危險因子(如藥物、腎功能不全)的病人Ciproxin應只用在治療效益大於危險性的情況下。如發生癲癇應停用本藥並開始適當

的治療。

(4)Fluoroquinolone類藥品可能增加精神相關不良反應(詳見仿單)

(5)Fluoroquinolone類藥品可能與血糖異常有關，包括有症狀的高血糖和低血糖(詳見仿單)。

(6)使用fluoroquinolone類藥品可能增加主動脈瘤及主動脈剝離相關風險，尤其是老年人，病人如有突發性腹痛、胸或背痛，應立即就醫。(詳見仿單)

📄 Avelox 仿單更新

1.仿單頁首新增：
Fluoroquinolone類藥品可能與肢體障礙及潛在不可逆嚴重不良反應之發生相關，包括肌腱炎、肌腱斷裂、周邊神經炎及中樞神經系統作用。使用本藥治療下列適應症時，應保留於沒有其他替代治療選擇時：慢性支氣管炎急性惡化，急性非複雜性膀胱炎。

2.警語及注意事項新增：
(1)過去使用quinolone或fluoroquinolone類藥品曾發生嚴重不良反應的病人，應避免使用Avelox。使用Avelox治療此類病人前，應先確認沒有替代治療選擇並謹慎評估效益/風險。

(2)Fluoroquinolone類藥品可能與增加癲癇(痙攣)風險、增加顱內壓(假性腦腫瘤)、頭暈和顫抖有關。Fluoroquinolone類藥物已知會誘發癲癇或降低癲癇閾值，已知或懷疑有中樞神經疾病的病人(例如嚴重腦動脈硬化、痙攣閾值偏低、曾有癲癇/痙攣的病史、腦部血流減少、腦部結構改變或中風)或具其他危險因子(如藥物、腎功能不全)的病人應多加小心。如發生癲癇應停用本藥並開始適當治療。

(3)肌腱炎及肌腱斷裂(好發於阿基里斯腱)，有時為雙側，可能在開始使用fluoroquinolone類藥品的48小時內很快發生。老年人、腎功能不良、曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇的病人會增加肌腱炎及肌腱斷裂的風險，故使用本藥應避免併用皮質類固醇。

(4)Fluoroquinolone類藥品可能增加精神相關不良反應(詳見仿單)。

(5)曾有嚴重低血糖導致昏迷或死亡的通報案例。(詳見仿單)。

(6)可能增加主動脈瘤及主動脈剝離相關風險，尤其是老年人(詳見仿單)。

📄 Foster 仿單更新

1.警語及使用注意事項新增：若出現視覺障礙或視力模糊，應轉診給眼科醫師(詳見仿單)。

2.交互作用新增：Beclomethasone與強效CYP3A抑制劑(如ritonavir、cobicistat)，不能排除全身性效應(增加)的可能，應謹慎使用與適當監測。

藥品異動

📄 新進藥品

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 266127 Dimethyl fumarate 120mg/cap (Tecfidera)	藥委會決議	Dimethyl fumarate 120mg/cap (Tecfidera [®])為新進臨購用藥。 ● 許可證適應症：「復發-緩解型多發性硬化症(relapse-remission multiple sclerosis)成人患者之治療(前一年有一次或一次以上復發者)。」 ● 本品項自109年3月3日起可開方使用。	


藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 622157 Dinalbuphine inj 150mg/2mL/vial (Naldebain ER)	藥委會決議	Dinalbuphine inj 150mg/2mL/vial (Naldebain ER [®])為新進處方用藥。 - 許可證適應症：「對預期手術後之中、重度急性疼痛，以預先給藥的方式緩解。」 - 本品項無健保給付，需自費使用。 - 本品項自109年3月3日起可開方使用。	
料號： 266220 Dimethyl fumarate 240mg/cap (Tecfidera)	藥委會決議	Dimethyl fumarate 240mg/cap (Tecfidera [®])為新進臨購用藥。 - 許可證適應症：「復發-緩解型多發性硬化症(relapse-remission multiple sclerosis)成人患者之治療(前一年有一次或一次以上復發者)。」 - 本品項自109年3月3日起可開方使用。	

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 192457 Cisatracurium inj 10mg/5mL/amp (Nimbex)	到藥通知	Cisatracurium inj 10mg/5mL/amp (Nimbex [®])藥品恢復供應。 - 本品項自109年3月5日起可開方使用。 - 缺藥期間暫代品項Atracurium inj 25mg/2.5mL/amp (Tracrium[®])自即日起鎖檔。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：924653 學名：Urokinase 主要成份及含量：250kIU/vial			
異動原因	廠商供藥不及		
異動描述	Urokinase inj 250kIU/vial (Urokinase-GCC [®])廠商供應不及暫缺，缺藥期間以Urokinase inj 60000 IU /vial (Urokinase-Green Cross [®])暫代。 - 自109年3月5日起啟用Urokinase inj 60000 IU /vial (Urokinase-Green Cross)。 - 規格不同請留意！		
商品名	Urokinase-GCCUrokinase-Green Cross		
製造廠名稱	Green Cross Corporation (綠十字)	China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (CCPC) (中國化學製藥)	
產地	韓國	臺灣	
健保碼	BC21379265	AC48722251	
料號	924653	924550	
主成份及含量	250kIU/vial	60000 IU /vial	

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥品	異動前	異動後
料號：546922 學名：Lorlatinib_恩慈 主要成份及含量：25mg/tab		
異動原因	轉知事項	
異動描述	Lorlatinib_恩慈 25mg/tab (PF-06463922 [®])藥品屆期，廠商改提供上市包裝Lorlatinib_恩慈 25mg/tab (Lorviqua [®])供臨床使用。 自109年3月3日起啟用新品。	
商品名	PF-06463922Lorviqua	
製造廠名稱	Pfizer Freiburg PPD Operations (輝瑞)	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH (輝瑞)
產地	德國	德國
中文名	專案藥品	瘤利克
藥品圖檔		