



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume33 No.48.1 - 2021/12/9

藥劑部公告

☐ Entyvio 仿單更新

1. 適應症更新：適用於治療以下的成人病人：

- 中度至重度活性潰瘍性結腸炎。
- 中度至重度活性克隆氏症。
- 對腫瘤壞死因子(TNF)阻斷劑或免疫調節藥物治療反應不佳、失去治療反應或無法耐受；或對皮質類固醇治療反應不佳、無法耐受或證實發生依賴性。

2. 用法用量更新：

- 部分治療反應下降潰瘍性結腸炎或克隆氏症成年病人，將安潰悠 300 毫克用藥頻率增加為每 4 週一次，可能具有效益。未產生反應的克隆氏症病人，在第 10 週施用安潰悠可能具有效益。如果治療中斷後需要重新開始安潰悠治療，可考慮每 4 週施用一次。
- 稀釋液新增：**乳酸林格爾注射液**
- 其他配製、稀釋與安定性更新，請詳閱[仿單](#)

☐ Cetorelix 仿單更新

新增儲存條件：「未開封的藥品一旦離開2-8°C後，可於30°C以下至多存放3個月」。

☐ Granocyte 仿單更新

1. 有關特定族群病人之注意事項新增：「嚴重心肺機能異常之病人、嚴重腎功能不全之病人、嚴重肝功能不全之病人，尚未進行療效或安全性的臨床研究」、對孕婦的授予新增：「僅於治療的益處大於風險的情況下，才對孕婦或可能懷孕的婦女使用 Granocyte」、對授乳婦的投與新增：「考慮是否應繼續授乳時，應考量到治療和授乳的好處」、對小兒等的投與新增：「動員造血幹細胞至週邊血液中、促進造血幹細胞移植時的嗜中性白血球數的增加、伴隨著骨髓發育不良症候群之嗜中性白血球減少症 尚未進行有關 Granocyte 之療效或安全性對於小兒的臨床研究」。
2. 副作用新增：「脾腫大」。

☐ NovoSeven 仿單更新

1. 輕至中度出血症狀(包括居家治療)新增：「僅限在諮詢血友病治療中心後，才可以考慮持續居家治療」。
2. 小兒族群新增：「對於臨床表型嚴重的12歲以下小兒族群，長期預防治療的臨床經驗有限」。
3. 副作用安全特性摘要新增：「最常通報的藥物不良反應是療效減低、發熱、皮疹、靜脈栓塞、搔癢及蕁麻疹」、新增：「噁心、注射部位疼痛」、新增：「起疹、漲紅、血管水腫」。
4. 藥效學特性新增：「一項觀察性試驗中，血小板無力症病人接受NovoSeven治療，單獨使用或併用抗纖維蛋白溶解藥物及/或血小板治療時，對於血小板輸注無效或有效的病人，療效比例分別為81%及82%，對於血小板抗體陽性或陰性的病人療效比例

- 分別為77%及85%」。
5. 藥動學特性新增：「兒童病人之穩定期之平均分布體積為196 mL/kg而成人病人為159 mL/kg」。
6. 有效期限新增：「配製後的溶液應存放於藥瓶中」。
7. 容器之性質與組成新增：「包裝內含:一小瓶(12ml)白色粉末用以調配注射液、一支裝在預填式(3ml)注射筒，供混合用溶劑、一支注射器推桿，一個轉接頭(藥品轉接頭內含25 micrometer的濾膜)」。

 Pamisol 廠商來函

廠商來函提醒醫護人員及病人使用含雙磷酸鹽類成分藥品可能發生顎骨壞死及非典型股骨骨折之風險，處方/使用藥品前/用藥期間須注意事項，以降低風險。Pamisol病人用藥安全指引，請見藥劑部網頁備註事項附件。

 Sevikar 仿單更新

1. 警語及注意事項新增：「對懷孕女性投予Sevikar可能會對胎兒造成傷害。」

2. 特定族群使用新增：「

● **懷孕婦女風險摘要：**對懷孕女性投予Sevikar可能會對胎兒造成傷害。在懷孕第2和第3期時，使用腎素-血管收縮素系統的藥物會使胎兒腎功能降低及增加胎兒和新生兒罹病率與死亡。多數流行病學研究顯示，在懷孕第一期使用腎素-血管收縮素系統藥物治療高血壓所產生的胎兒異常，和使用其他種類的抗高血壓藥物並無分別。發現懷孕時，立刻停用Sevikar。懷孕期間應考慮使用其他降血壓療法。

● **哺乳風險摘要：**有關Sevikar是否會分泌至人類乳汁、對哺乳嬰兒影響或對乳汁分泌影響的資料有限。Amlodipine會分泌至人類乳汁。Olmesartan會分泌至大鼠乳汁。由於藥物對授乳嬰兒具有潛在不良作用，應告知授乳女性接受Sevikar治療期間不建議哺乳。

● **兒科病人：**Sevikar對兒科病人的安全性和效果尚未確立。」詳見仿單

藥品異動

 供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 604925 Modafinil 200mg/tab (Provigil)	廠商供藥不及	Modafinil 200mg/tab (Provigil [®])因廠商供應不及缺藥。 ● 餘量供慢箋使用。	
料號： 102421 Bazedoxifene 20mg/tab (Viviant)	廠商停止供應	Bazedoxifene 20mg/tab (Viviant [®])本品項因廠商停產，庫存餘量用罄為止，新處方請勿開立慢箋。	


藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號：303040 Epinastine oph sol 0.05%,5mL/btl (Relestat)	廠商停止供應	Epinastine oph sol 0.05%,5mL/btl (Relestat [®])廠商停產，新處方建議以院內其他同類藥品如507046 Ketotifen oph sol 0.025% 5mL/btl (Zaditen [®])替代。 餘量供慢箋使用。	

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號：206846 學名：Conjugated Estrogens 主要成份及含量：0.625mg/g, 14g/tube		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Conjugated Estrogens vag cream 14g/tube (Premarin [®])藥品包裝及仿單的藥商地址變更，印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：605324 學名：Moxifloxacin 主要成份及含量：400mg/tab		
異動原因	產地變更	
異動描述	Moxifloxacin 400mg/tab (Avelox [®])製造廠、產地變更，藥品包裝及仿單印刷變更，裝箱數量由1箱96盒變更為1箱60盒。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Bayer AG (拜耳)	Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l. (拜耳)
產地	德國	義大利

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：905321 學名：Trientine 主要成份及含量：300mg/cap		
異動原因	製造廠變更	
異動描述	Trientine 300mg/cap (MetaCu [®])藥品製造廠變更，藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Shiteh Organic (西德有機)	Shiner Pharm Corp.(旭能醫藥生技)
產地	臺灣	臺灣
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：741626 學名：Prasugrel 主要成份及含量：3.75mg/tab		
異動原因	製造廠變更	
異動描述	Prasugrel 3.75mg/tab (Efient [®])製造廠變更，藥品包裝及仿單印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Daiichi Sankyo Propharma Co Ltd, Takatsuki plant	Taiyo Pharma Tech Co., Ltd., Takatsuki Plant
產地	日本	日本

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥品	異動前	異動後
料號：746740 學名：Progesterone 主要成份及含量：8% 90mg/tube		
異動原因	產地變更	
異動描述	Progesterone vag gel 8% 90mg/tube (Crimone [®])藥品製造廠名稱變更，藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Fleet Lab Ltd	Dendron Brands Limited
產地	英國	英國
藥品圖檔	