



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume33 No.14~15 - 2021/4/15

藥劑部公告

☐ Isoptin 仿單更新

交互作用新增：「Verapamil和主要藉由CYP3A4酶或P-糖蛋白(P-gp)代謝的藥物合併服用時，與藥物濃度的上升可能有相關性，而增加或延長藥物療效和副作用。」

☐ Keytruda 仿單更新

適應症新增：「**食道鱗狀細胞癌**：治療患有復發性局部晚期或轉移性食道鱗狀細胞癌，經確效之試驗檢測出腫瘤有PD-L1表現(綜合陽性分數[CPS]≥10)，且先前曾接受一種(含)以上全身性治療，於治療時或治療後發生疾病惡化的病人。」詳見[仿單](#)。

☐ Victoza 仿單更新

- 1.適應症新增：「10 歲以上第 2 型糖尿病病人，作為血糖控制之輔助治療」。
- 2.投藥與重要說明新增：「只有在溶液呈現澄清無色且無任何異物時才能使用」。
- 3.兒童劑量新增：「Victoza 起始劑量為每日 0.6 mg，每日使用 0.6 mg 至少 1 週後，若需要進一步控制血糖，劑量可增加至每日 1.2 mg，[詳見仿單](#)」。
- 4.警語及注意事項新增：「禁止用於本身或家族有髓質甲狀腺癌(MTC)的病人，或多發性內分泌腫瘤症候群的病人，[詳見仿單](#)」、「10 歲以上的兒童病人不論是否併用抗糖尿病藥物，使用 Victoza 時發生低血糖的風險較高」。
- 5.臨床試驗中的經驗新增：「青少年和 10 歲以上兒童病人的不良反應類型及嚴重度，與成人族群相似，[詳見仿單](#)」。
- 6.交互作用新增：「開始使用 Victoza 時，應考慮減少併用的促胰島素分泌劑 (例如磺醯脲類藥物) 或胰島素劑量，以減少低血糖的風險」。
- 7.特殊族群新增：「依據 72 名第二型糖尿病兒童、青少年受試者 (10 至 17 歲) 的資料，進行 Victoza 族群藥物動力學分析Victoza用於兒童受試者的藥物動力學特性，與成人相同」。
- 8.新增第二型糖尿病成人病人的血糖控制試驗結果，Victoza 治療組與對照組比較，其糖化血色素(HbA 1c)與空腹血糖(FPG)，在臨床統計上均有明顯改善，[詳見仿單](#)。

☐ Lamictal 仿單更新

- 1.劑量與用法，2-12歲兒童修改為：「一般維持劑量為5-15 mg/kg，每日一次或分兩次服用」。
- 2.交互作用新增：「沒有證據顯示lamotrigine在臨床上會明顯誘發或抑制cytochrome P450酵素。Lamotrigine可能誘導本身的代謝，但此種作用很輕微，並沒有明顯的臨床影響」，誘導lamotrigine醛糖酸化的藥物讓lamotrigine效果降低，交互作用藥品詳見仿單。

☐ Ziagen 仿單更新

- 1.感染的傳染，修改為：「 Ziagen能顯著減少性交傳播的風險，但仍無法排除殘餘風險。應遵從國家指引採取預防傳播的措施」。

2.交互作用，新增：「體外試驗顯示abacavir可能抑制CYP1A1、可能有限地抑制CYP3A4酵素系統」、「會導致riociguat的AUC_(0-∞)增加至文獻中健康受試者的3倍」。

3.懷孕與授乳：「 abacavir被認為與胚胎及胎兒產生毒性跡象有關」。

Juluca 仿單更新

Juluca(Dolutegravir/Rilpivirine)：

1.禁忌新增：「接受dofetilide治療的病人，可能導致dofetilide的血中濃度升高而引發嚴重且/或危及生命的事件」。

2. 胚胎-胎兒毒性新增：「假如JULUCA對懷孕婦女及胎兒的預期效益大於潛在風險，可考慮在第二和第三孕期時服用JULUCA」。

3.試驗資料新增：「未顯示dolutegravir有增加不良生育結果的風險、rilpivirine於懷孕至產後之耐受性良好。和感染HIV-1之成人已知安全性資料相比，沒有發現新的安全性訊息(詳見[仿單](#))」。

4.藥物交互作用新增：使dalfampridine濃度上升。

5.懷孕與產後，新增：懷孕期間的總rilpivirine約比產後低30%，對於病毒學受抑制的病人不會有臨床上的影響(詳見[仿單](#))。

Rapamune 仿單更新

1. 警語及注意事項新增：「使用斥消靈治療期間必須避免使用活性疫苗」

2. 特殊族群新增：「(1)懷孕：根據動物試驗及作用機轉，斥消靈用於孕婦時會對胎兒造成危害；(2)目前沒有sirolimus對哺乳的嬰兒或乳汁產生的影響相關資料。(3)在斥消靈治療之前及治療期間，必須開始採取有效的避孕措施，而且必須持續採取有效的避孕措施直至停止斥消靈治療12週後。(4)在使用斥消靈的女性中，已經發現卵巢囊腫和月經異常(包括停經與月經過多)。男性使用斥消靈曾報導發生無精子症，在大多數情況下，停止使用斥消靈後，此情況可恢復。」

3. 臨床藥理學新增：「哺乳類rapamycin標靶(mTOR)抑制劑如sirolimus已在體外試驗中證明了會經由抑制某些生長因子生成，而可能影響血管新生、纖維母細胞增殖、與血管滲透性。」

4. 包裝規格刪除：「因為斥消靈不會經由皮膚吸收，因此不需要特別注意」詳見[仿單](#)

Prezcobix 仿單更新

適應症新增：「適用於與其他抗反轉錄病毒藥物併用,以治療未曾接受治療及曾經接受治療且未發生darunavir抗藥性相關取代的人類免疫缺乏病毒(HIV-1)感染之成人與體重至少40公斤之**兒童病人患者**。」

兒童使用之臨床試驗、藥物動力學資訊詳見[仿單](#)



藥品異動

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 842024 Normacol Plus 7g/pack(Sterculia/Frangulagranule)	到藥通知	Normacol Plus® 7g/pack(Sterculia/Frangulagranule) 恢復供應，但供貨數量不穩，暫時禁止開立慢性病處方箋。 自110年4月9日起可開方使用。	

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號：464052 學名：Indocyanine Green 主要成份及含量：25mg/vial		
異動原因	製造廠變更	
異動描述	Indocyanine Green inj 25mg/vial (Diagnogreen [®])製造廠變更，藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟新品。	
製造廠名稱	Daiichi Sankyo Propharma Co Ltd, Takatsuki plant (第一三共)	Taiyo Pharma Tech Co., Ltd., Takatsuki Plant
產地	日本	日本
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：863522 學名：Telmisartan 主要成份及含量：80mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Telmisartan 80mg/tab (Micardis [®])因排版印刷錯誤，自批號C79847起藥品鋁箔學名印刷由「Telmistartan」修正為「Telmisartan」。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前		異動後
料號：087643 學名：Atropine 0.125% 主要成份及含量：5mL/btl			
異動原因	年度招標		
異動描述	Atropine oph sol 0.125% 5mL/btl (Kintropine [®])因招標異動，改用Atropine oph sol 0.125% 5mL/btl (Atropin [®])替代。 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	KintropineAtropin		
製造廠名稱	Synpac-Kingdom (景德)	Sinphar (杏輝)	
產地	臺灣	臺灣	
健保碼	AC49016421	AC47473421	
中文名	舒視平點眼液 0.125%	阿托平眼藥水 0.125%	
藥品圖檔			

藥 品	異動前		異動後
料號：684757 學名：Pemetrexed 主要成份及含量：500mg/vial			
異動原因	產地變更		
異動描述	Pemetrexed 愛寧達 500mg/vial (Alimta [®])藥品製造廠、產地變更，藥品包裝印刷變更。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
製造廠名稱	Eli Lilly & Company (禮來)	Vianex S.A. (Plant C)	
產地	美國	希臘	
藥品圖檔			

藥 品	異動前	異動後
料號：167929 學名：Celecoxib 主要成份及含量：200mg/cap		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Celecoxib 200mg/cap (Celebrex [®])藥品包裝廠變更，藥商地址變更，外盒及鋁箔尺寸變更。 ● 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔	 The image shows the 'Before' state of the product. At the top, two white capsules with yellow bands and '200' markings are shown next to a ruler. Below are blister packs of capsules, some with green labels. At the bottom are two boxes of Celebrex (Celecoxib) 200mg capsules, one in English and one in Chinese.	 The image shows the 'After' state of the product. At the top, a blister pack of capsules is shown. Below are more blister packs, some with white labels. At the bottom are two boxes of Celebrex (Celecoxib) 200mg capsules, one in English and one in Chinese, with updated labeling.

藥品	異動前	異動後
料號：941137 學名：Valproate 主要成份及含量：200mg/mL, 40mL/btl		
異動原因	產地變更	
異動描述	Valproate oral sol 200mg/mL, 40mL/btl (Depakine [®])藥品製造廠、產地變更，藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Unither Liquid Manufacturing	Sanofi Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
產地	法國	土耳其
藥品圖檔	 The image shows the 'Before' state of the product. At the top are two boxes of Depakine (Valproic acid) oral solution, 200 mg/mL, one in English and one in Chinese. Below are two brown glass bottles of the solution with white caps, and a purple oral syringe.	 The image shows the 'After' state of the product. At the top are two boxes of Depakine (Valproic acid) oral solution, 200 mg/mL, one in English and one in Chinese, with updated labeling. Below are two brown glass bottles of the solution with white caps, and a purple oral syringe.