



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume33 No.31.1 - 2021/8/5

藥劑部公告

☐ Vfend 仿單更新

1. 禁忌症新增：「Voriconazole不可與CYP3A4受質、terfenadine、astemizole、cisapride、pimozide、quinidine，或ivabradine併用，因為這些藥物的血漿濃度升高可能導致QTc延長及罕見的torsade de pointes」
2. 交互作用新增**Venetoclax**：「雖然未經臨床研究，但voriconazole可能會顯著升高venetoclax的血漿濃度。在venetoclax劑量調整期間應避免併用voriconazole。穩定每日給藥情況下需遵循venetoclax處方資訊調降venetoclax濃度；建議密切監測是否出現毒性徵象。」
詳見[仿單](#)

☐ Lipitor 仿單更新

1. 警語及注意事項新增：「**會升高發生肌肉病變/橫紋肌溶解之風險的藥物交互作用**：併用letermovir時，每日劑量勿超過atorvastatin 20毫克；併用letermovir與cyclosporine時，避免使用atorvastatin」
2. 藥品交互作用新增**Letermovir**：「每天併用 atorvastatin 20mg 與 letermovir 480mg 會導致atorvastatin的暴露量上升(AUC比值：3.29)。Letermovir會抑制P-gp、BCRP、MRP2、OAT2運輸蛋白的排出作用和肝臟運輸蛋白OATP1B1/1B3的代謝功能，因而增加atorvastatin的暴露量，故每日不可使用超過20毫克的Lipitor。當letermovir與cyclosporine併用時，由CYP3A和OATP1B1/1B3調節之併用藥物交互作用程度可能會有所不同。對併用letermovir與cyclosporine的病人不建議使用LIPITOR。」
詳見[仿單](#)

藥品異動

☐ 供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號：129442 Buprenorphine 35 µg/h, 20mg/patch (Transtec)	到藥通知	Buprenorphine 35 µg/h, 20mg/patch (Transtec [®])藥品恢復供應。 本品項自110年8月3日起可開方使用。	
料號：465059 Influenza vaccine(quadrivalent) 自費 0.5mL/syrg (VaxigripTetra)	到期、屆期退庫	自費流感疫苗 Influenza vaccine(quadrivalent) 0.5mL/syrg (VaxigripTetra [®])藥品效期屆期。 本品項自110年8月1日起鎖檔。	

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號：361959 學名：Fat emulsion_Olive/ Fish oil 主要成份及含量：20% 250mL/btl		
異動原因	包裝變更	
異動描述	SMOFlipid [®] inj 20% 250mL/btl (Fat emulsion_Olive/ Fish oil)藥品標籤格式及印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：404020 學名：gliPlizide 主要成份及含量：5mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Glipizide 5mg/tab (Glipizide [®])藥品鋁箔及外盒尺寸變更。 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		