



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume33 No.29~30 - 2021/7/29

藥劑部公告

☐ 因疫情警戒降為第二級，麻醉藥品取消延長開立天數。

依衛福部規定辦理:於疫情警戒標準第三級(含)以上期間，癌症疼痛、非癌症慢性疼痛及末期居家病人使用口服、舌下劑成癮性麻醉藥品，可延長處方天數至 2 8 日。

- 因110年7月27日(週二)起疫情警戒降為第二級，麻醉藥品取消延長開立天數。

☐ Lexapro 仿單更新

警語及注意事項新增：「**隅角閉鎖性青光眼(angle-closure glaucoma, ACG)**：SSRIs製劑包含escitalopram可能會影響瞳孔大小，導致瞳孔散大。這種散瞳作用，尤其是對於有發病傾向的病人，可能會使眼角變窄，導致眼內壓升高及隅角閉鎖性青光眼。因此，患有隅角閉鎖性青光眼或有青光眼病史的病人應謹慎使用escitalopram。」詳見[仿單](#)

☐ Opdivo 仿單更新

1. 適應症新增：「**非小細胞肺癌**：(1)併用 ipilimumab 適用於帶有PD-L1 ($\geq 1\%$)且不具EGFR或ALK腫瘤基因異常的成年轉移性或復發性非小細胞肺癌(NSCLC)病人的第一線治療；(2)併用ipilimumab及2個週期含鉑化學治療適用於不具EGFR或ALK腫瘤基因異常的成年轉移性或復發性非小細胞肺癌(NSCLC)病人的第一線治療。」
2. 製備及給藥新增：「(1)併用 ipilimumab 時,同一天先給予 OPDIVO 後再給予 ipilimumab。(2)當併用 ipilimumab 和化學治療時,同一天應先給予 OPDIVO 接著給予 ipilimumab,最後再給予化學治療。應使用個別的輸液袋和過濾器。」
3. 警語及注意事項新增：「接受每 2 週一次 OPDIVO 3 mg/kg 併用每 6 週一次 ipilimumab 1 mg/kg 治療的非小細胞肺癌(NSCLC)病人中,有 8.7% (50/576)病人發生免疫媒介性肺炎」
4. 上市後經驗新增：「噬血球性淋巴組織球增生症(hemophagocytic lymphohistiocytosis) (包括致命案例)、自體免疫溶血性貧血(包括致命案例)」
劑量與臨床試驗資訊詳見[仿單](#)

☐ Diflucan 仿單更新

交互作用新增：「(1) **Ibrutinib**：Fluconazole等CYP3A4中效抑制劑會提高ibrutinib的血漿濃度，並可能增加毒性的風險。若無法避免併用，請按照ibrutinib處方資訊中的指示減少ibrutinib的劑量，並提供密切的臨床監測。(2)**Tolvaptan**：當CYP3A4受質tolvaptan與中度抑制CYP3A4的藥物fluconazole同時併用時，tolvaptan的暴露量會顯著升高(AUC升高200%；Cmax升高80%)，具有明顯增加不良反應的風險，尤其是明顯的利尿、脫水和急性腎衰竭。有關併用tolvaptan之建議，請參照tolvaptan處方資訊中的指示。」詳見[仿單](#)

☐ Innocan仿單更新

新增適應症
與5-fluorouracil、leucovorin及oxaliplatin合併治療(FOLFIRINOX)，做為轉移性胰臟癌之第一線治療藥物。

詳見[仿單](#)

☐ Enbrel 25mg/syrg仿單更新

不良反應新增：「發炎性腸道疾病」詳見[仿單](#)

☐ Inspra 仿單更新

1. 適應症新增：「高血壓」
2. 用法用量新增：「高血壓：建議起始劑量為50 mg每天一次。Eplerenone的完整治療作用會在4週內出現。如果是對50 mg每天一次的劑量血壓反應不足的病人，請將Eplerenone的劑量調升至50 mg每天兩次。不建議使用更高的Eplerenone劑量，因為相較於100 mg，更高劑量對血壓無更強的作用，反而會伴隨更高的高血鉀風險。」
3. 禁忌新增：「禁用於合併有高血壓和肌酸酐清除率<50 mL/min的病人」
4. 不良反應新增：「高血壓：安慰劑對照固定劑量試驗中，血清鉀的平均上升量與劑量有關。最常見停用Eplerenone的理由是頭痛、頭暈、心絞痛/心肌梗塞(MI)和γ-GGT上升。」不良反應與高血壓之臨床研究詳見[仿單](#)

藥品異動

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：546623 學名：Lorazepam 主要成份及含量：2mg/tab			
異動原因	到藥通知		
異動描述	Lorazepam 2mg/tab (Larpam [®])藥品恢復供應，缺藥期間暫代品項Lorazepam 2mg/tab (Anxicam [®])庫存用罄鎖檔。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	AnxicamLarpam		
製造廠名稱	Swiss Pharm (瑞士藥廠)	Shyh Dar (世達)	
產地	臺灣	臺灣	
健保碼	AC585611G0	AC33929100	
中文名	安心平錠	樂眠錠	

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品		異動前		異動後	
料號：362401					
學名：Fentanyl					
主要成份及含量：12mcg/h, 2.1mg/patch					
異動原因		轉知事項			
異動描述		衛福部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠供應之Fentanyl patch 12mcg/h, 2.1mg/patch (Durogesic D-TRANS [®])庫存用罄，改用Fentanyl patch 12mcg/h, 1.375mg/patch (Opiodur [®] Transdermal Patch)替代。 舊品用罄後啟用新品。			
商品名		Durogesic D-TRANSOpiodur Transdermal Patch			
製造廠名稱		Janssen Pharmaceutica NV (嬌生)		Lavipharm S.A. (Lavipharm)	
產地		比利時		希臘	
健保碼		BC248703B9		BC276563B9	
中文名		多瑞喜穿皮貼片劑		歐必德穿皮貼片劑	
主成份及含量		12mcg/h, 2.1mg/patch		12mcg/h, 1.375mg/patch	
藥品圖檔					

藥 品	異動前	異動後
料號：943824 學名：Verapamil 主要成份及含量：240mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Verapamil SR 240mg/tab (Isoptin [®])藥品包裝由「14錠/片，28錠/2片/盒」變更為「15錠/片，30錠/2片/盒」。 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		