



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume32 No.37.1 - 2020/9/18

藥劑部公告

Wellbutrin XL仿單更新

- 1.注意事項新增：「應採用可達到良好控制的最少劑量，以降低過量的風險」、「血清素症候群與藥物過量有關」、「Wellbutrin XL並未核可用於戒菸治療，使用bupropion輔助戒菸的病人中，曾有發生嚴重精神不良事件」(詳見仿單)、「使用後可能發生瞳孔擴張，房角狹窄且未接受虹膜切除術可能觸發其隅角閉鎖性青光眼的急性發作」。
- 2.副作用新增：「眼內壓上升、隅角閉鎖性青光眼、瞳孔擴張」。

Augmentin Syrup仿單更新

- 1.劑量及用法新增：「用餐開始時服用，可得到最佳吸收效果，並可將腸胃不適降到最低。如未重作評估，使用不可持續超過14天。輕至中度感染劑量25/3.6至45/6.4 mg/kg/day，分兩次。較嚴重感染症劑量45/6.4至70/10 mg/kg/day，分兩次。兩歲以下兒童，沒有超過45/6.4 mg/kg/day的臨床數據。不同體重範圍所需的劑量請見仿單。原腎絲球過濾率改為肌酐清除率(CrCl)>30 mL/min無需調整劑量」。
- 2.不良反應新增：「無菌性腦膜炎」。
- 3.貯存注意事項新增：「本品泡製前應儲存在原始包裝中並置於乾燥處防潮，泡製後應冷藏，不可冷凍」。
- 4.使用及操作說明新增：「使用前應檢查瓶上鋁箔密封是否完整」。

Tanatril 仿單更新

- 1.重要注意事項新增：「與Neprilysin抑制劑(如Sacubitril/valsartan或racecadotril)併用，可能增加血管性水腫的風險」。
- 2.相互作用新增：「當併用Neprilysin抑制劑與ACE抑制劑時可能增加血管性水腫風險，因此sacubitril/valsartan需在最後一次服用imidapril至少36小時後才能開始使用。Imidapril需在最後一次服用sacubitril/valsartan至少36小時後才能開始使用」。

Royalsense Acne Gel 若蘭仙施面皰凝膠

Royalsense Acne Gel 若蘭仙施面皰凝膠，目前本院使用的均是正常品，已無需回收之批號藥品。

Glyxambi 仿單更新


- 1.藥物交互作用新增：「與胰島素促泌劑或胰島素併用時，可能須降低胰島素促泌劑或胰島素劑量，以減少低血糖症的風險」。
- 2.患者諮詢資訊新增：「請提醒病人，開始使用Glyxambi 前應先評估腎功能，並於之後定期評估」。

藥品異動

新進藥品

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 244529 HDM Extract SL 12 SQ-HDM/tab (Acarizax)	到藥通知	HDM Extract SL 12 SQ-HDM/tab (Acarizax [®])為新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「治療成年人(18-65歲)塵蟎引起之過敏性鼻炎。」 - 本品項自109年9月15日起可開方使用。	

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 227259 CMV Immunoglobulin inj 5000unit/50mL/btl (Cytotect)	到藥通知	CMV Immunoglobulin inj 5000unit/50mL/btl (Cytotect [®])藥品恢復供應。 本品項自109.09.11起可開方使用。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號： 407158 學名：Gonadorelin 主要成份及含量：0.1mg/mL/amp			
異動原因	到藥通知		
異動描述	Gonadorelin inj 0.1mg/mL/amp (Relefact LH-RH [®])缺藥，改用Gonadorelin inj 0.1mg/mL/amp (LHRH Ferring [®])替代。 - 本品項自109年9月18日起可開方使用。 - 本品項為專案藥品，使用時需填寫病患同意書。		
商品名	Relefact LH-RHLHRH Ferring		
製造廠名稱	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (賽諾菲安萬特)		Ferring GmbH (輝凌)
產地	德國		德國

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		