



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume33 No.46~47 - 2021/12/2

藥劑部公告

☐ Aggrastat 仿單更新

- 適應症文字修改:「併發症」改為:「非ST段上昇之急性冠心症、NSTE-ACS」;「冠狀動脈成形術...」改為:「經皮冠狀動脈介入性治療(PCI)」。
- 用法用量內容增訂:「起始輸注」改為「起始注射/輸注」;「冠狀動脈放射線檢查」改為「血管攝影(angiography)」;「冠狀動脈成形術」改為「經皮冠狀動脈介入性治療(PCI)」; PCI起始注射劑量由10 microgram/kg改為25 microgram/kg, 並新增維持輸注速率「輸注12-24小時, 至多48小時」、根據體重所做之劑量調整方法指引修訂, 詳見仿單。
- 注意事項新增:
 - AGGRASTAT 不建議使用於下列的病人: 最近 6 週至 3 個月內曾施行重大手術或曾經歷嚴重身體創傷、其病史、症狀或檢驗結果顯示有主動脈剝離.....」。
 - AGGRASTAT 使用於下列的病人應小心: 24 小時內曾發生非壓迫性血管穿刺.....」、出血注意事項新增「勿與血栓溶解治療併用.....」、新增鈉含量「每一小瓶50mL, 鈉含量189mg, 限鈉的病人, 應將此列入考量」。
- 腎功能不全修訂:嚴重腎功能不全病人AGGRASTAT劑量應降低50%.....」。
- 懷孕修訂:除非有明確需要, 懷孕期間不建議使用AGGRASTAT。
- 藥品交互作用修訂「AGGRASTAT與heparin、ASA及clopidogrel併用時的出血發生率與heparin、ASA及clopidogrel單獨使用時的相當」、「AGGRASTAT不建議併入血栓溶解治療-同時或AGGRASTAT投與前48小時或同時併用相當程度增加出血風險的藥品 (例如口服抗凝血劑、其他注射型GP IIb/IIIa 抑制劑、葡聚糖溶液 (dextran solutions)...出血風險預期會升高」。
- 修訂「上市後通報之不良反應報告摘要」詳見仿單。
- 過量新增:「過量時症狀少數顱內出血和腹膜後出血的案例.....過量處理可考慮給予病人輸血及/或血小板」。
- 臨床試驗新增「ADVANCE、EVEREST、TARGET研究」詳見仿單。

☐ Sporanox 仿單更新

- 適應症說明**新增**:
 - 皮膚/黏膜/眼科疾病: 皮黴菌, **包含高度角質化部份, 如腳底足癬及掌部手癬**;
 - 全身性黴菌病, **只有以下的黴菌感染**: 全身性麴菌病與念珠菌病; 隱球菌感染 (包括隱球菌腦膜炎): 免疫功能不全的隱球菌感染病人及所有罹患中樞神經系統之隱球菌感染的病人在不適用第一線治療或治療無效的情況下才能使用; 組織漿菌病; 芽生黴菌病; 孢子絲菌病 (**包含淋巴皮膚的/皮膚的以及表皮外的**)
- 適應症**刪除**: 其他罕見之全身或熱帶性黴菌感染。
- 用法與用量**刪除**: 某些免疫功能不全的病人 (如嗜中性白血球過少、AIDS或器官移植之病人) 服用SPORANOX膠囊之 itraconazole 口服生體可用率可能會降低, 故劑量可能須加倍。

適應症與其用法用量更新請見[仿單](#)

☐ Cabometyx 仿單更新

適應症新增: 「CABOMETYX 與 nivolumab 合併療法適用於未曾接受治療的晚期腎細胞癌病人。」其用法用量更新詳見[仿單](#)

--

Zytiga 仿單更新

1. 警語及注意事項新增：「**低血糖**：投予 abiraterone acetate 於接受 thiazolidinediones (包含 pioglitazone) 或repaglinide 藥物的糖尿病病人曾被通報嚴重的低血糖症，在abiraterone acetate治療期間和停止使用之後，應監測糖尿病病人的血糖。評估是否需要調整糖尿病藥物的劑量以降低低血糖的風險」

2. 上市後經驗新增：「**無防禦性過敏反應 (anaphylactic reactions)**：嚴重的過敏反應，包括但不限於吞嚥困難或呼吸困難、臉部腫脹、嘴唇腫脹、舌頭腫脹或喉嚨腫脹或發癢的皮疹（蕁麻疹）。」

詳見[仿單](#)

Bridion 仿單更新


適應症新增：「**用於 2 歲以上兒童及青少年族群因 rocuronium 或 vecuronium 誘導神經肌肉阻斷的常規逆轉藥物。**」其用法用量、不良反應、藥效學及藥物動力學更新請見[仿單](#)。

藥品異動

新進藥品

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 490529 Ixazomib 4mg/cap (Ninlaro)	到藥通知	Ixazomib 4mg/cap (Ninlaro[®])為內科部新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「Ninlaro併用 lenalidomide及 dexamethasone適用於接受過至少一線治療的多發性骨髓瘤患者。」 - 本品項自110年11月30日起可開方使用。	

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 024628 Acitretin 10mg/cap (Neotigason)	轉知事項	Acitretin 10mg/cap (Neotigason [®])因採購問題自110年11月30日起暫限舊個案使用。	

刪除品項

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 889829 Topotecan 口服 1mg/cap (Hycamtin)	廠商停止供應	Topotecan 1mg/cap (Hycamtin[®])廠商停止供應，目前庫存已全數用罄，因無替代廠牌，刪除處方用藥。 本品項自110年12月1日起鎖檔停用。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：863924 學名：Terbinafine 主要成份及含量：250mg/tab			
異動原因	廠商停止供應		
異動描述	Terbinafine 250mg/tab (Lamisil [®])廠商停止供應，改用杏輝廠Terbinafine 250mg/tab (Fungitech [®])替代。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	LamisilFungitech		
製造廠名稱	Novartis Pharma Produktions GmbH (諾華)		Sinphar (杏輝)
產地	德國		臺灣
健保碼	BC19320100		AC45950100
中文名	療黴舒 (14/片)		黴特克舒

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：603047 學名：Minoxidil 主要成份及含量：60mL/btl		
異動原因	廠商停止供應	
異動描述	Minoxidil Topical Solution 2% 60mL/btl (Regaine [®])廠商停止供應，以Minoxidil solution 2% 60mL/btl (PBF Minoxidil Solution [®])替代。 自110年11月30日起啟用新品。	
商品名	RegainePBF Minoxidil Solution	
製造廠名稱	Contract Pharmaceuticals Ltd (Contract)	Panion & BF (寶齡富錦)
產地	加拿大	臺灣
中文名	落建生髮液 2%	寶齡昇髮密碼養髮液2%
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：106641 學名：Benzydamine 主要成份及含量：1.5mg/mL, 30mL/btl		
異動原因	製造廠變更	
異動描述	Benzydamine oral spray 30mL/btl (Comfflam [®])製造廠變更，藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Aupa Biopharm (歐帕生技醫藥)	Shiner Pharm Corp.(旭能醫藥生技)
產地	臺灣	臺灣

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：589155 學名：Metoclopramide 主要成份及含量：10mg/2mL/amp		
異動原因	轉知事項	
異動描述	Metoclopramide 10mg/2mL/amp (Primperan [®])藥品恢復供應。 暫代品項用罄後啟用新品。	
商品名	MetoclopramidePrimperan	
製造廠名稱	Ying Yuan (應元)	Delpharm Dijon (Delpharm Dijon)
產地	臺灣	法國
健保碼	AC25849212	BC23178212
中文名	胃得朗	腹寧朗
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：905723 學名：Trifluridine/Tipiracil 主要成份及含量：15mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Lonsurf [®] 15mg/tab (Trifluridine/Tipiracil)藥品由原先1盒2片20錠改為1盒4片20錠，每片由10錠改為5 錠，包裝及鋁箔印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥品	異動前	異動後
料號：446222 學名：Hydroxychloroquine 主要成份及含量：200mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Hydroxychloroquine 200mg/tab (Plaquenil®)藥品鋁箔印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		